

1939
Aus dem Institut für Gerichtliche und Soziale Medizin
zu Halle-Saale.

Direktor: Prof. Dr. G. Schrader.

Über den plötzlichen Tod aus natürlichen Ursachen bei Erwachsenen

Inaugural-Dissertation

zur Erlangung des Grades eines Doktors der Medizin
der Hohen Medizinischen Fakultät
der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
zu Halle-Saale

überreicht von

Gottfried Blackstein
aus Magdeburg

LANE MEDICAL LIBRARY
SAN FRANCISCO

Halle 1939

Verlag wissenschaftlicher Werke Konrad Triltsch, Würzburg-Aumühle

1. Referent:
Professor Dr. S c h r a d e r.

2. Referent:
Professor Dr. W ä t j e n.

Tag der mündlichen Prüfung: 14. Juli 1939.

Gedruckt mit Genehmigung der Fakultät.

Inhaltsverzeichnis.

	Seite
Einleitung	1
14 plötzliche Todesfälle aus natürlichen Ursachen bei Erwachsenen.	
I. Allgemeines	4
II. Erkrankungen des Herzens, seiner Gefäße und der Aorta...	9
a) Coronarsklerose	11
b) Syphilitische und arteriosklerotische Veränderungen der Aorta	15
c) Herzklappenfehler	21
d) Erkrankungen des Herzmuskels und Herzbeutels	22
III. Erkrankungen des Gehirns und seiner Hüllen	25
a) Spontane Hirnblutung	27
b) Spontane intermeningeale Blutung	28
c) Andere Erkrankungen des Gehirns und seiner Hüllen ..	29
IV. Erkrankungen des Respirationsapparates	30
a) Pneumonie und Pleuritis.....	33
b) Bronchitis	35
c) Thromben-Embolie der Arteria pulmonalis	35
d) Lungentuberkulose	36
e) Übrige Lungentodesfälle	36
V. Erkrankungen des Verdauungs- und Urogenitalapparates ..	37
a) Gefäßrupturen des Verdauungstraktes	38
b) Epitheliale Geschwülste des Verdauungstraktes	39
c) Perforierende Appendicitis.....	39
d) Magengeschwür	39
e) Incarceration einer Leistenhernie	39
f) Chronische Nierenerkrankung	39
VI. Erkrankungen anderer Organe	40
a) Epilepsie	40
b) Allgemeine Kachexie	40
c) Perniciöse Anämie	40
d) Wegen Fäulnis unaufgeklärter Fall	41
Die forensische Bedeutung des plötzlichen Todes aus innerer Ursache	41
Schlußbetrachtung	45
Schrifttumsverzeichnis	45



Digitized by the Internet Archive
in 2026

A. Einleitung.

Immer wieder überrascht der plötzliche unerwartete Tod eines Menschen nicht nur die Angehörigen aufs Empfindlichste, sondern berührt auch die Umwelt stets aufs Neue, da der Tod mitten in das schaffendes Leben hineingreift, recht häufig aus vermeintlich guter Gesundheit heraus erfolgt und ärztliche Hilfe nicht möglich ist. An Hand des Materials der Stadt Basel hat Thorner ermittelt, daß in den Jahren 1917 bis 1920 die plötzlichen Todesfälle der Gesamttodesfälle ausmachten, ein Prozentsatz, der sicher nicht allgemein zu verwerthen ist, der uns aber doch die Bedeutung des plötzlichen Todes aus natürlicher Ursache nicht nur in wissenschaftlicher, sondern vor allem auch in allgemein medizinischer Hinsicht klar vor Augen führt. So hat auch der plötzliche Tod seit über 100 Jahren in zahlreichen Arbeiten im Schrifttum seinen Niederschlag gefunden. 1854 berichtete G. Ferrario über „1048 Fälle plötzliche Todesfälle“. Weiter erschienen vor dem großen Material von Lesser, Ehrenrooth, Herrich-Schöpf, Kisch, Haberda, Merkel, Kolisko u. a. und am Kriegsende von Pöder über 211 Fälle, von Schneider über 140 Fälle, von Thorner über 278 Fälle, von Markovitsch über 406 Fälle und von Koopmann über 839 Fälle. Eine der umfassendsten Arbeiten erschien 1932 von Weyrich, in der er über 2668 Fälle plötzlichen Todes bei Erwachsenen und über 1022 Fälle plötzlichen Todes bei Kindern und Jugendlichen berichtet, bei der Verstorbenen bis zum vollendeten zwanzigsten Lebensjahr der letzten Gruppe rechnet. Diese Einteilung finden wir bei den meisten Verfassern nicht.

Versuche, den plötzlichen Tod aus natürlicher Ursache zu definieren, finden sich in den oben genannten Arbeiten, wie in anderen zahlreichen Ausführungen. Weyrich versteht unter plötzlichen Todesfällen „Fälle, in denen der Tod aus innerer Ursache ohne wesentliche äußere Gewalteinwirkung aus vermeintlich voller Gesundheit oder nach geringfügigen, nicht ärztlich behandelten Krankheitserscheinungen plötzlich eingetreten war“. Ähnlich schreiben Thorner und Kolisko den plötzlichen Tod.

Schönberg definiert die plötzlichen Todesfälle folgendermaßen: „Tot aufgefundene Personen oder solche, welche während der Arbeit oder einer sonstigen Verrichtung plötzlich oder nach kurzer Unwohlsein starben, wobei in der Umgebung des Toten von einer bestehenden Krankheit keinerlei Kenntnis bestand.“ Eine von bisher Gesagten etwas abweichende Definition gibt Aschoff, wenn er sagt: „Unter plötzlichen Todesfällen haben wir nach dem Sprachgebrauch schnell ablaufende und daher eine diagnostische Klärung nicht zulassende, anscheinend von selbst oder auf geringfügige oder unbemerkt gebliebene äußere Einflüsse hin einsetzende tödliche Prozesse zu verstehen.“ Dazu zählt er „Fälle unbemerkt gebliebener tödlicher Traumen ohne klinisch nachgewiesene gröbere äußere Verletzung“ und führt als Beispiel u. a. einen Fall einer Herzruptur nach einem Hufschlag bei nur geringen äußeren Hautverletzungen. Derartige Fälle wie der eben angeführte sind wohl nicht ohne weiteres zu den plötzlichen Todesfällen aus natürlicher Ursache hinzuzuzählen, denn es wird stets schwierig sein abzugrenzen, inwieweit das äußere Moment oder die innere Disposition verantwortlich zu machen sind für den Eintritt des Todes. Ähnlich gelagert sind die Todesfälle, die eintreten während der Geburtshilfe oder der Narkose, wie sie Kolisko beschrieben hat. Und doch muß das Bestreben dahin gehen, im Interesse aller Beteiligten, insbesondere des Arztes, bei den zuletzt genannten Fällen eine gerechte Entscheidung über die Ursache des eingetretenen Todes herbeizuführen.

Daß außer endogenen Ursachen recht oft „Gelegenheitsursachen“ eine große Rolle spielen für den plötzlichen Eintritt des Todes, darauf weisen besonders Jaffee, Witrich, V. Koc, Schwarzmüller, Kolisko und andere Autoren hin. Kolisko teilt diese ein in äußere und innere Gelegenheitsursachen und versteht unter den erstgenannten körperliche Anstrengung und geschlechtliche Aufregung, unter den letztgenannten Hustenstoß, aufregende Träume, Magenüberfüllung und Menstruation. F. Reuter führt noch an schmerzhaftes Erkranken, und Koopmann beschreibt 32 Fälle von Alkoholismus und 191 Fälle = 25,0% des Gesamtmaterials, bei denen er einen Status digestivus feststellen konnte. Aschoff bezeichnet die Verdauungsperiode und die starke Füllung des Magens als physiologische Disposition zum plötzlichen Tode. (Döring hat einen derartigen Fall näher beschrieben). Wie die tödliche Wirkung dieser Gelegenheitsursachen zu Stande kommt ist oft nicht leicht zu sagen. Hering weist in diesem Zusammenhang darauf hin, daß die Gelegenheitsursachen selten das Herz direkt angreifen, sondern daß die Einwirkung auf dasselbe meist durch Vermittlung der Nerven g

ht; er denkt dabei an die bekannte hemmende Wirkung des
vagus vagus und an die beschleunigende des Nervus sympa-
us.

in seinen schon angeführten Arbeiten teilt Weyrich sein
angreiches Material in eine Gruppe von Todesfällen bei Er-
wachsenen und in eine bei Kindern und Jugendlichen und setzt als
Grenze das vollendete zwanzigste Lebensjahr. Er begründet diese
Einteilung damit, daß beide Geschlechter bis zu diesem Zeitpunkt
der Entwicklung und im Wachstum begriffen sind und damit
unter denselben Bedingungen in konstitutioneller, körperlicher und seeli-
cher Hinsicht unterliegen als es vom einundzwanzigsten Lebens-
jahr ab der Fall sein dürfte. Eine frühere Altersstufung, wie sie
A. Thörner mit dem vollendeten vierzehnten Lebensjahr an-
gibt, hält Weyrich nicht für angebracht, da er die Pubertätszeit
eingeschlossen sehen möchte in die anderen Bedingungen un-
terschiedene Entwicklungszeit des Menschen. Demgemäß unterteilt er
die Gruppe der plötzlichen Todesfälle bei Kindern und Ju-
gendlichen und die bei Erwachsenen verschieden. Die erstgenannte
Gruppe teilt er auf entsprechend den verschiedenen Entwicklungs-,
Wachstumsperioden der Kinder in: Neugeborene (bis zu
4 Wochen) — Säugling (1. Monat bis 1 Jahr) — Kleinkind (1. bis
6. Jahr) — Schulkind (6. bis 14. Jahr) — Pubertätsalter (14. bis
20. Jahr). Die Gruppe der plötzlichen Todesfälle bei Erwachsenen
teilt Weyrich auf nach dem topographischen Sitz der
zum Tode führenden Erkrankung. Da er in der Lage war, 2668
plötzliche Todesfälle bei Erwachsenen der Jahre 1914 bis 1917
und 1919 bis 1929 aus Wien und Graz statistisch zu erfassen, kommt
bei seiner Arbeit wegen dieser großen Zahl der Fälle erhöhte Bedeu-
tung zu. Das Hauptergebnis sei hier kurz angeführt:

Erkrankungen des Herzens, seiner Gefäße und der Aorta	1 116 Fälle = 42 %
Erkrankungen des Respirationsapparates	623 Fälle = 23 %
Erkrankungen des Verdauungs- und Genitalapparates	343 Fälle = 13 %
Erkrankungen des Gehirns und seiner Hüllen	237 Fälle = 9 %
Erkrankungen anderer Organe	349 Fälle = 13 %

Diese Einordnung der plötzlichen Todesfälle nach dem topo-
graphischen Sitz der zum Tode führenden Erkrankung findet sich
ähnlich bei Weyrichs Lehrer Haberdas. Eine ähnliche
Einteilung trifft Koopmann in 1. Herztod, 2. Lungentod und
3. Tod aus anderen natürlichen Ursachen. Folgende Gruppierung
gibt Schneider vor: 1. Fälle mit unbemerkt gebliebener
Todesursache, 2. Fälle mit bekannt gebliebener direkter äußerer Todesursache, 3. Fälle
mit bekannt gebliebener direkter innerer Todesursache und 4. Fälle

mit unerkannt gebliebener indirekter innerer Todesursache. Schneider folgt hiermit einer Einteilung, wie sie auch schon Aschoff angegeben hat, und läßt so den topographischen Sitz der Erkrankung für seine Auswertung unberücksichtigt. Lesser und Thorne r gruppieren ihr Leichengut in Fälle, in denen die Ursache nicht zu ermitteln ist und verstehen darunter akute und chronische Affektionen lebenswichtiger Organe, ohne jedoch ein wirklich zum Tode führende Erkrankung eines Organs feststellen zu können, und in Fälle, in denen die Todesursache zu ermitteln war; es folgt eine Unterteilung ähnlich der Weyrichs. Eine topographische Einteilung der zum Tode führenden Erkrankung — und zwar nach ihrem Sitz in den verschiedenen Körperhöhlen — nehmen Richter und Kolisko vor, während Lichte einteilt in Herzstörungen, in durch Alkoholismus bedingte Erkrankungen und in Infektionskrankheiten.

BI. Allgemeines.

Im folgenden wird über 314 Fälle plötzlichen Todes aus natürlicher Ursache bei Erwachsenen berichtet, d. h. nach Weyrich nur bei Personen, die das 20. Lebensjahr überschritten hatten. Diese Todesfälle stammen aus der Zeit vom 1. Juli 1932 bis zum 30. Juni 1938, also aus einer Zeitspanne von 6 Jahren, und sind erfolgt in Halle selbst und in seiner Umgebung. Aufgenommen wurden nur die Fälle plötzlichen Todes, bei denen der Tod ohne wesentliche äußere Gewalteinwirkung eintrat und bei denen anamnestisch eine ärztliche Behandlung der zum Tode führenden Erkrankung nicht festzustellen war. Es handelte sich meistens um nur noch schwache Lebenszeichen von sich gebende oder gar tot aufgefundene Personen, bei denen der hinzugezogene Arzt nicht mehr in der Lage war, eine sichere Diagnose zu stellen. Maßgeblich für die Auswahl der Fälle war also die Definition des plötzlichen Todes, wie sie Schönberg und Weyrich angegeben haben. Ebenfalls wird Weyrich in der Einteilung der plötzlichen Todesfälle gefolgt, indem auch hier der topographische Sitz der zum Tode führenden Erkrankung in den Vordergrund gestellt wird.

Diese 314 plötzlichen Todesfälle bei Erwachsenen verteilen sich auf 209 Todesfälle beim Manne und auf 105 Todesfälle bei der Frau. Es ergibt sich so ein prozentuales Verhältnis von 66,5 % Todesfällen beim Manne und von 34 % bei der Frau. Ein ähnliches Ergebnis haben auch Koopmann (72 % : 28 %) und Lesser (65,5 % : 34,5 %) gefunden. Ein Verhältnis von 53 % : 47 % hat nur Thorne r errechnet; er fand sogar in zwei von den vier erfaßten Jahren ein Überwiegen des weiblichen Anteiles. Auch Weyrich verzeichnet nur einen geschlechtlichen


igen Anteil von 55,4 % beim Mann und von 44,6 % bei der Frau. Jedoch gibt er an, daß eine getrennte Auszählung des Nachschuttmaterials ein Überwiegen von 77 % für den Mann ergibt. Es ist möglich, daß auch bei Thorner die von ihm erfaßten Jahresjahre 1917 bis 1920 infolge ihrer schlechteren Ernährungsbedingungen diese prozentuale Ausgeglichenheit hervorrufen. Einen ähnlichen hohen Prozentsatz wie Weyrich gibt A. Legros (nach Thorner) an, indem von 69 200 Todesfällen in den Jahren 1854 bis 1889 der männliche Anteil 76,5 % betrug. Übereinstimmend lassen sich so feststellen, daß annähernd 65 % der plötzlichen Todesfälle die männliche Bevölkerung betreffen. Neben konstitutionellen Momenten ist sicherlich hierfür die berufliche Tätigkeit bestimmend, die oft verbunden ist mit einer unregelmäßigen und unzureichenden Ernährung. In diesem Sinne weist F. Reu auf die Trias: Alkohol, Nikotin und Lues hin, welchen Schädigungen der im Beruf stehende Mann stärker ausgesetzt ist als die Frau.

Dieser starke männliche Anteil an der Gesamtzahl der plötzlichen Todesfälle findet sich auch bestätigt bei einer Betrachtung der Verteilung der Todesfälle auf die einzelnen Jahrzehnte des Lebens wie auf die einzelnen Monate des Jahres. In der folgenden Aufstellung sind 195 Todesfälle beim Mann und 103 Todesfälle bei der Frau erfaßt worden. Von 16 Fällen fehlten die Altersangaben in den Protokollen. Es starben im:

	3.	— 4.	— 5.	— 6.	— 7.	— 8.	— 9. Dezennium
Thorner:	5	13	22	54	45	48	8
Reu:	2	8	9	15	30	33	6
Ges.:	7	21	31	69	75	81	14

Von den insgesamt 298 Fällen, die hier aufgeführt sind, starben 195 Personen im 8. Jahrzehnt ihres Lebens; das sind 27,2 % aller Fälle. Weyrich hat festgestellt, daß die meisten plötzlichen Todesfälle im Alter von 51 bis 60 Jahren erfolgen, und dafür einen Prozentsatz von 26 % errechnet. Dasselbe sagt der Schweizer Thorner, während Lochte berichtet, daß im 7. Dezennium der Höhepunkt der Sterblichkeit liege. Ob für diese Unterschiede graphische oder klimatische Einflüsse als Ursache heranzuziehen sind, ist schwer zu sagen. Ein etwas anderes Bild ergibt sich, wenn wir die Sterblichkeit der Geschlechter getrennt betrachten. Wesentlich ist noch festzustellen, daß 75,2 % der 298 Fälle in der Altersgruppe vom 51. bis 80. Lebensjahr starben.

Deutlich gibt die folgende graphische Darstellung das gleichzeitige, konstante Ansteigen der Gesamtzahl der Todesfälle bis zum 8. Jahrzehnt wieder und dann den raschen Abfall im 9. Jahrzehnt. Der Kurve am meisten entspricht die Darstellung der weib-



lichen Todesfälle. Auch sie weist ihr Maximum im 8. Dezennium auf, um dann ebenso schnell abzufallen. Es starben im Alter von 71 bis 80 Jahren 33 Frauen; das sind 32% aller 103 weiblichen Fälle. Im 7. Jahrzehnt ihres Lebens starben 30 Frauen = 29.1%. Das geben zusammen 61,1 % der weiblichen Gesamtzahl, die in diesen beiden Dezennien plötzlich verstarben. Weyrich hat den Höhepunkt für die Sterblichkeit der Frauen für das Alter von 61. bis 70. Lebensjahr errechnet, und der Prozentsatz betrug bei ihm 27 %. Er fügt weiter hinzu, daß 50 % der Frauen nach dem 60. Jahre starben. In unserer Aufstellung würden sich für dieselbe Zeit 67 % ergeben. Hieraus ergibt sich eindeutig — gleichlautend für die Sterblichkeit beider Geschlechter, wie für die der Frauen allein — 1. eine Verschiebung des Maximums der Sterblichkeit um 2 bzw. 1 Jahrzehnt im Leben im Vergleich zu den Ergebnissen Weyrichs, die er in seinem Wiener und Graz-Bezirk errechnet hat, und 2. auch eine nicht unbedeutende Erhöhung des prozentualen Anteiles an der Gesamtsterblichkeit in diesem 7. und besonders 8. Dezennium in unserer Aufstellung ebenfalls im Vergleich zu der Weyrichs. Dementsprechend weisen wir in den übrigen Lebensjahren eine geringere Sterblichkeit als Weyrich auf. Das heißt, daß in dem von uns erfaßten mitteldeutschen Bezirk der plötzliche Tod durchschnittlich der Menschen, insbesondere die Frauen, in einem höheren Alter (7. bis 8. Jahrzehnt) und dann in größerer Anzahl ereilt als in der Ostmark (6. bis 7. Jahrzehnt).


Diese Feststellung wird nicht beeinflusst durch eine getrennte Betrachtung der Sterblichkeit der Männer. Die diese darstellende Kurve weist ihren Höhepunkt bereits im 6. Dezennium auf, und dann langsamer — nochmals mit einem kleinen Anstieg im 8. D.

ium — abzufallen. 54 Fälle sind das Maximum im 6. Jahr-
t, die 27,7 % der Gesamtsterblichkeit der Männer ausmachen.
% der männlichen Todesfälle erfolgten in diesen 3 letzten
zehnten. Das entspricht der Gesamtdarstellung (männliche
weibliche Fälle), die 75,2 % für diese Zeit verzeichnet. Auch
y r i c h hat den Höhepunkt für die männliche Sterblichkeit
as 51. bis 60. Lebensjahr angegeben und 30 % errechnet. Dann
zwar die Zahl der Todesfälle konstant ab. Abweichend wie-
von der unsrigen Aufstellung ist seine Angabe, daß allein
aller Männer im Alter von 41 bis 60 Jahren sterben. Ähn-
s berichtet Thorner, der das männliche Sterblichkeits-
mum für das 6. Jahrzehnt errechnet hat, während L o c h t e
5. nennt. Die Statistiken decken sich also insoweit, daß die
liche Bevölkerung am häufigsten in ihrem 6. Jahrzehnt vom
lichen Tod betroffen wird. Überblickt man jedoch wieder
Lebensjahre, so kommt man zu derselben Feststellung wie
er Gesamt- und Frauensterblichkeit, daß bei W e y r i c h der
iesem Falle männliche Anteil des Volkes den plötzlichen
wiederum durchschnittlich um 1 Jahrzehnt früher erleidet
ie hier angeführten Fälle zeigen, daß also in jenem Bericht
50 % der männlichen Todesfälle im 5. und 6. Jahrzehnt er-
n, während von uns das 6. und 7. Dezennium dafür errechnet
le.

emerkenswert ist noch an der graphischen Darstellung, daß
veibliche Kurve die männliche nicht schneidet, daß also in
em Jahr die Sterblichkeit der Frauen größer war als die der
er. Begründet ist dies insbesondere dadurch, daß überhaupt
viel weniger Frauen den plötzlichen Tod erlitten als Män-
Da der weibliche Anteil in den Jahren mit den meisten
sfällen in unserem Material erheblich größer (67 % aller
en) ist als bei W e y r i c h (50 % aller Frauen), während die
liche Statistik annähernd gleiche Prozentsätze (50 % aller
er) aufweist, bleiben für die übrigen, d. h. jüngeren Jahr-
e in W e y r i c h s Statistik prozentual mehr weibliche Todes-
als in der unsrigen. Hinzu kommt, daß bei W e y r i c h der
il der Frauen an der Gesamtsterblichkeit an und für sich
rößerer ist. So ist es erklärlich, daß er mitteilt, daß zwischen
21. und 40. Lebensjahr die Sterblichkeit bei den Frauen
n der der Männer oder sogar größer als diese ist, während
n übrigen Jahren stets der männliche Anteil überwiegt.

on verschiedenen Autoren wurde untersucht, ob jahreszeit-
Einflüsse oder gar die unterschiedlichen klimatischen Ver-
isse einzelner Monate in ursächlichen Zusammenhang zu brin-
ind mit dem Eintritt des plötzlichen Todes. W e y r i c h hat
anet, daß 12 % aller Todesfälle sich im Februar als Maximum

ereignen, während das Minimum (5%) im August liegt. Allgemein verzeichnet er ein Ansteigen der plötzlichen Todesfälle in den kälteren Monaten und ein Absinken in den wärmeren. Dasselbe berichtet Koopmann. Er gibt an, daß von Oktober bis März 59,4% der Todesfälle eintraten und im Sommerhalbjahre nur 40,6 %. Bei Key-Aberg und Berger liegt das Maximum an Todesfällen im Februar und Dezember und das Minimum im August und September; bei Thorner erstgenanntes im November und Dezember, letztgenanntes auch im August. Pöder dagegen hat eine höhere Sterblichkeitsziffer in den 6 wärmeren Monaten. Es ist wohl anzunehmen, daß der Grund dafür in den klimatischen Verhältnissen seiner estnischen Heimat liegt. In der folgenden Darstellung wurden 314 Todesfälle in Harau (209 Männer und 105 Frauen) gemäß ihrem monatlichen Eintreten erfaßt.



Der Monat April verzeichnet die größte Gesamtsterblichkeit (58 Todesfälle = 12,1% aller Fälle). Das Minimum liegt im Juli mit nur 18 Fällen = 5,7 %. Im Januar starben 36 Personen = 11,5 % und andererseits im August 19 Personen = 6,1 %. In den übrigen Monate liegen mit ihren Todesziffern gleichmäßig verteilt dazwischen, ein leichtes Absinken im prozentualen Anteil im Sommer und bereits wieder ein leichtes Ansteigen im Herbst aufweisend. Betrachten wir die beiden Geschlechter getrennt, so weisen sie gleichfalls den Höchststand an Todesfällen im April und dann im Januar auf und den Tiefstand auch im Juli und August, entsprechend der Gesamtaufstellung. Eine Addition der Todesfälle von Oktober bis März, also des Winterhalbjahres ergibt einen Prozentsatz von 52,2 % = 164 Fälle für diese Zeit. Daraus ersieht man, daß die Sterblichkeit in der kälteren Jahreshälfte nur um geringes größer ist als in der wärmeren. Hervorgerufen wird dies dadurch mit, daß das Todesmaximum in unserer Aufstellung erst im April liegt. Maximum und Minimum sind nur getrennt durch eine Zeitspanne von 2 Monaten. Während der übrigen Zeit des Jahres schwankt die Todesziffer in den einzelnen Monaten nur um wenig.

bei der Untersuchung nach der Ursache des plötzlichen Todes die Einordnung Weyrichs nach dem topographischen der zum Tode führenden Erkrankung übernommen. Es ergibt sich folgendes Bild:

Erkrankungen des Herzens, seiner Gefäße und der Aorta	235 Fälle = 74,9 %
Erkrankungen des Gehirns und seiner Hüllen	34 Fälle = 10,8 %
Erkrankungen des Respirationsapparates	28 Fälle = 8,9 %
Erkrankungen des Verdauungs- und Urogenitalapparates	10 Fälle = 3,2 %
Erkrankungen anderer Organe	7 Fälle = 2,2 %

I. Erkrankungen des Herzens, seiner Gefäße und der Aorta (235 Fälle)

Auffallend ist der überragende Prozentsatz der ersten Gruppe, besagt, daß bei fast $\frac{3}{4}$ der plötzlich Verstorbenen Erkrankungen des Herzens oder der Kranzgefäße oder der Aorta die Ursache waren. Bei allen Autoren findet sich ein Überwiegen der Herz- und Gefäßaffektionen über die anderen möglichen Ursachen. Doch nur Key-Aberg berichtet, daß von 635 Fällen $635 = 74,5\%$ Endarteriitis chronica deformans zuzulag. Die übrigen Verfasser führen niedrigere Prozentangaben. Pöder nennt $43,6\%$, Thorner 50% , Koopmann 50% und in einer anderen Statistik $46,6\%$, Weyrich und auch Kirsch 42% , Lesser $41,5\%$, Schneider $40,7\%$, Lochte $38,3\%$, Markovin $32,5\%$, und Haberda verzeichnet unter 2662 Fällen nur 2662 Herztode $= 24\%$. Diese kurzen Angaben zeigen eindeutig, welche große Bedeutung die Herz-Gefäß-Erkrankungen für den plötzlichen Tod haben. Kirsch ist der Meinung, daß Herzranke vom 50. Lebensjahr ab auf einen plötzlichen Tod gefaßt sein müssen, und fügt hinzu, daß das atrophische Herz eine viel geringere Reservekraft habe als ein normales sie besitze.

Entsprechend dem überragenden Anteil des Mannes über- am plötzlichen Tod ist er auch der wesentliche Träger die- großen Gruppe der Herz-Gefäßerkrankungen. 165 Männer $70,2\%$ aller an Herz-Gefäßerkrankungen Verstorbenen erlitten Herz- oder Gefäßtod; und demgegenüber stehen nur 70 Frauen $29,8\%$. Lesser gibt den weiblichen Anteil mit $29,6\%$ an, Weyrich mit $38,3\%$ und Thorner mit 32% . Aufschlußreich ist die Gegenüberstellung des Anteiles beider Geschlechter an Todesfällen mit den letztgenannten Zahlen. Weyrich berichtet, daß die Männer $55,4\%$ aller Fälle ausmachten, aber unter den Herz-Gefäßerkrankungen; die Frauen $44,6\%$ aller

Fälle und nur 38,3 % der genannten Erkrankungen. Es starb hiernach mehr Männer an Herzlähmung oder ähnlichem als ihr Anteil an der Summe aller plötzlichen Todesfälle entsprach. Und die Frauen erlagen in größerem Maße den übrigen 4 Krankheitsgruppen. Dieselbe Beobachtung konnten wir machen. 66 % der Verstorbenen sind Männer, die aber mit 70,2 % am häufigsten den Herz-Gefäßerkrankungen erlagen. Umgekehrt machen Frauen nur 29,8 % der hieran überhaupt Verstorbenen aus, das sind 34 % aller Todesfälle. Auch hier zeigt sich eine Erhöhung des männlichen Anteiles an den Herz-Gefäßerkrankungen gegenüber den Gesamttodesfällen zu Ungunsten des Mannes. Daraus ergibt sich, daß die männliche Bevölkerung nicht nur dem plötzlichen Tod an sich, sondern insbesondere dem plötzlichen Tod durch Herzkranzgefäß- und Aortenerkrankungen wesentlich mehr ausgesetzt ist als die weibliche Bevölkerung. Ihre Bestätigung findet die Feststellung auch in folgendem: Die 165 an Herz-Gefäßerkrankungen verstorbenen Männer stellen 78,9 % aller plötzlichen männlichen Todesfälle (209) dar, während die 70 weiblichen Todesfälle „nur“ 66,7 % aller weiblichen Fälle (105) ausmachen. Dies zeigt ebenfalls, daß beide Geschlechter bei weitem am häufigsten an Herz-Gefäßtod erleiden, daß aber das männliche Geschlecht in besonderem Maße beteiligt ist.

Es starben an Erkrankungen des Herzens, seiner Gefäße und der Aorta im:

	3.	— 4.	— 5.	— 6.	— 7.	— 8.	— 9. Dezennium
Männer:	3	7	18	45	58	41	5
Frauen:		4	7	8	25	22	6
Insges.:	3	11	25	53	61	63	11

Diese Aufteilung umfaßt 227 Todesfälle (157 Männer und 70 Frauen). Das Maximum liegt im 8. Jahrzehnt des Lebens. Die Männer weisen die größte Sterblichkeitsziffer im 6. Dezennium und die Frauen im 7. und 8. auf — entsprechend den Verhältnissen bei allen Todesfällen. In ihrem 51. bis 80. Lebensjahr starben 79 % der Männer und 75,7 % der Frauen. Key - Aber Thorner, Lesser u. a. stimmen darüber ein, daß die Männer besonders im 6. und die Frauen im 7. Jahrzehnt den Herz-Gefäßerkrankungen erliegen, wie es diese Aufstellung auch ergibt. Koopmann führt noch an, daß im 2. und 3. Dezennium die Herztode mehr bei den Frauen vorkämen. Das können wir nicht bestätigen, wenngleich das 2. Jahrzehnt nicht mit erfaßt wurde, denn im 3. wurden gar keine Todesfälle bei Frauen gegenüber 3 männlichen festgestellt.

Bei der Betrachtung der einzelnen Monate hinsichtlich der Sterblichkeit bei Herz-Gefäßerkrankungen ergibt sich folgendes Bild:

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	November	Dezember
Männer:	15	12	13	18	14	12	12	12	12	19	14	12
Frauen:	8	4	5	10	10	5	3	3	5	4	5	8
Gesamt:	23	16	18	28	24	17	15	15	17	23	19	20

Die schon in der Gesamtaufstellung weist auch hier der April die meisten Todesfälle auf (11,9%). Das stimmt auch — neben Mai — für das weibliche Geschlecht. Doch das Maximum für Männer liegt im Oktober, der schon in der Allgem. Statistik leichtes Plus gegenüber den anderen Monaten verzeichnet. Nur einer geringen Zunahme der Todesfälle vom August ab im Herbst ist kaum ein besonderer Einfluß eines Monats oder Jahreszeit auf die Herz-Gefäßerkrankungen festzustellen. Siskow und Reuter sind der Meinung, daß die meisten Herzfälle von Dezember bis März vorkämen. Weyrich teilt den jahreszeitlichen Einfluß wäre nur gering und wirke sich in einem Maße bei den Lungenkrankheiten aus. Er könne nur behaupten, daß im Sommer die Herztodesfälle etwas abnähmen. Ob dies in welchem Grade ist das auch aus unserer Aufstellung ersichtlich. Die Erkrankungen des Herzens, seiner Gefäße und der Aorta können sich folgendermaßen auf:

Coronarsklerose

arteriosklerotische und arteriosklerotische Veränderungen der Aorta 1. mit Stenose und 2. ohne Stenose der Abgangsstellen der Kranzarterien

Herzklappenfehler

Krankungen des Herzmuskels und Herzbeutels (ausschließend die Folgezustände nach Embolie und Thrombose der Kranzarterien des Herzens).

Coronarsklerose:

In 176 Fällen waren sklerotische Veränderungen der Kranzarterien der ursächliche Anlaß zum plötzlichen Tod. Das heißt: von allen plötzlich Verstorbenen starben an Coronarsklerose deren Folgen, die weiterhin 74,9 % aller Herz-Gefäßerkrankungen ausmachen, dieser bei weitem größten der 5 Krankheitsarten. Mehr als die Hälfte der Todesfälle wies also Coronarsklerose als Ursache bei der Sektion auf. 29mal fand sich ferner bei den übrigen Fällen diese Kranzgefäßerkrankung als Befund, so daß insgesamt 205 von 314 plötzlichen Todesfällen Coronarsklerose erkennen ließen. Damit ist die große Bedeutung der Coronarsklerose — nicht nur im Rahmen der Herz-Gefäßerkrankungen — sondern ganz allgemein als Todesursache klar herausgestellt. Einen derartig hohen Prozentsatz

weisen andere Autoren nicht auf. Schneider nennt 14 Todesfälle durch Coronarsklerose (jedoch ohne die hierdurch bedingten Folgezustände). Weyrich berichtet, daß 20.6% aller seiner Fälle an Coronarsklerose starben = 49.28 % aller Herzgefäßerkrankungen. Unter 1000 Herztodesfällen, sagt Reuter hätte die Coronarsklerose 52 % ausgemacht. Und Ascho schreibt, daß 35 Herztodesfällen 20 mal die Coronarsklerose grunde gelegen hätte. Von einer gleichfalls sehr großen Bedeutung der Coronarsklerose als Todesursache berichten Koomann, Key-Aberg, Bofinger u. a. und bestätigen damit, daß die Sklerose der Kranzgefäße nach wie vor die häufigste Ursache des reinen Herztodes — insbesondere des plötzlichen —

Diese 176 Todesfälle an Coronarsklerose teilen sich auf 130 männliche und 46 weibliche Fälle. Das entspricht einem Verhältnis von 73.9 % zu 26.1 %. Annähernd $\frac{3}{4}$ der an Coronarsklerose Verstorbenen sind Männer gewesen. Auch Weyrich, Key-Aberg und Schneider weisen darauf hin, daß mehr Männer an Coronarsklerose starben als Frauen. Geht man in die Berechnung weiter, so ergibt sich, daß — entsprechend der großen Bedeutung der Coronarsklerose als Herz-Gefäßerkrankung — dieser wieder als Hauptursache der plötzlichen Todesfälle überhaupt — die 130 Männer 78.8 % aller männlichen Herztodesfälle und 62.2 % aller männlichen Fälle und die 46 Frauen 65.7 % aller weiblichen Herztodesfälle und 45.8 % aller weiblichen Fälle ausmachen; das heißt, daß die Coronarsklerose die bei weitem häufigste Todesursache der Frau und insbesondere des Mannes ist, denn annähernd $\frac{2}{3}$ aller Männer ereilte durch sie der plötzliche Tod. Eine Betrachtung des zeitlichen Eintrittes des Todes weist keine Veränderungen auf gegenüber der Aufstellung beim Herzgefäßtod. Die Zahl der Todesfälle steigt an vom 3. Jahrzehnt bis zum 7./8. Jahrzehnt. F. Reuter teilt als Maximum das Alter vom 55. bis 65. Lebensjahr mit. Weyrich nennt das 7. Jahrzehnt. Das Maximum unserer Fälle liegt im 8. Dezennium, das der Männer im 6. und das der Frauen im 7. Im 9. Dezennium weisen beide Geschlechter je 5 Fälle auf; in Anbetracht der größeren Zahl der verstorbenen Männer also eine größere Sterblichkeit der Frauen in diesem Jahrzehnt. Umgekehrt starben an Coronarsklerose im Alter vom 21. bis 30. Jahr 3 Männer und keine Frau und weiter bis zum 40. Lebensjahr 4 Männer und 1 Frau also eine größere Sterblichkeit des Mannes in den jüngeren Jahren.

Die Coronarsklerose umfaßt folgende einzelne Krankheitsbilder:

1. Cor mit Herzschielen	.	.	.	.	.	71 Fä.
2. Cor mit fettiger Degeneration	.	.	.	.	.	10 Fä.

3. Cor ohne wesentliche degenerative Veränderungen des Herzmuskels	49 Fälle
4. Spontane Herzruptur	19 Fälle
5. Cor mit frischer Thrombose, bzw. akuter Embolie der Kranzgefäße	26 Fälle
6. Spontane Ruptur einer Coronararterie	1 Fall

Bei den Krankheitsbildern 1, 2, 3 und 5 ist durch Herzlähmung plötzliche Tod herbeigeführt. 156 derartige Todesfälle wurden gezählt, die 49,7 %, also fast die Hälfte aller plötzlichen Todesfälle darstellen. In den übrigen 2 Gruppen ist die reine Verblutung (in den Herzbeutel mit gleichzeitiger Herztamponade) die Ursache, die bedeutend weniger häufig auftrat (20 Fälle). Diese Herzlähmung zustande kommt, darüber liest man verschiedene Ansichten. Aschoff meint, daß ihm der Eintritt des erwarteten Todes am klarsten ist bei einem plötzlichen thrombotischen Verschuß einer Kranzarterie. Weniger einfach wäre er zu erklären bei einer langsam eintretenden Gefäßverengung, da Anastomosen bestünden. Man müsse wohl funktionelle Momente mit geltend machen für die Herzlähmung in diesem Falle. Als Nebenefunde fanden sich neben einer oft hochgradigen Verengung der Coronargefäße Schwielen, Infarkte, anämische Stellen und degenerative Veränderungen des Herzmuskels wie Fibrillation und braune Atrophie. Diese Nebenefunde beschrieb Key-Aberg als mitwirkende Ursache für eine Herztamponade. Er erwähnt insbesondere die Nekrosen als Mitursache, sagt jedoch, daß diese oft in Heilung übergehen und daß der Verlust an Muskelsubstanz durch eine vikariierende Hyperämie ersetzt würde. Als Hauptgrund sieht er die Sklerose der Kranzgefäße an als Hindernis für die Zirkulation des Blutes. Key glaubt, die Herzlähmung auf einen Krampf der Gefäße zurückführen zu dürfen, der Herzkammerflimmern verursacht. Die Kammern lieferten in diesem Zustand kein Blut mehr. Die Folge davon wäre, daß der arterielle Blutdruck sinkt. Die verschiedenen Organe beantworteten diesen Mangel an Blutzufuhr durch Reizerscheinungen, denen dann später die Lähmung folgt.

Weiter fand sich an Nebenefunden — besonders im linken Ventrikel — bei 23 Fällen eine Dilatation des Ventrikels, bei 10 Fällen eine Hypertrophie, bei 18 Fällen eine Hypertrophie und Dilatation, 7 mal Klappenaffektionen und verschiedentlich größere und kleinere Aneurysmen im linken Ventrikel mit wandständigem Thrombus. Schon früher wurde die Meinung Kirschs erwähnt, daß hypertrophische Herzen eine viel geringere Reservekraft besitzen, so daß dadurch eine Disposition zum Versagen des Herzens gegeben ist. Ferner teilt Aschoff mit, daß im hypertro-

phischen Herzen auch eine Veränderung im Reizleitungssystem vorliege, und zwar drückt sich diese — nach Mönckeb erg — in einer Übererregbarkeit der untergeordneten autonomen Zentren aus. Alle diese Veränderungen mögen dazu beitragen, daß ein Herz, das vielleicht klinisch gesund aussieht, plötzlich seine Arbeit einstellt. Außer vielen anderen Nebenfunden, die sich vorfinden, soll hier noch ein Befund erwähnt werden, der zwar nicht selbst am Herzen fand, aber das Herz in seiner Auswirkung unmittelbar betrifft. 4 mal lagen Hydropericardium und Hydrothorax vor, die ein schon durch Coronarsklerose belastetes Herz in seiner Arbeit noch weiterhin beeinträchtigen.

Sklerotisch verändert waren alle Kranzgefäße des Herzens, am meisten jedoch der Ramus descendens sinister. Dasselbe kommt zum Ausdruck im Sitz des embolischen, bzw. thrombotischen Materials bei den hierdurch bedingten 26 Todesfällen. 23 mal fand sich der Thrombus im Ramus dexter, 1 mal im Ramus circumflexus sinister und 22 mal im Ramus descendens sinister. Auch Mönckeb erg hat feststellen können, daß vornehmlich die linke Coronararterie klerosiert ist, und sieht die Begründung dafür in der stärkeren funktionellen Inanspruchnahme des linken Ventrikels. An Coronarthrombose verstarben 19 Männer und 7 Frauen, die zusammen 11,05% aller Herztodesfälle und 8,5% aller Todesfälle ausmachen. Koopmann gibt 9,6% aller Herztodesfälle an Coronarthrombose an, aber einschließlich der Fälle mit Aortitis luica. Der Prozentsatz derjenigen ist also nicht gering, die plötzlich an einer Thrombose oder Embolie eines der Kranzgefäße sterben.

Auffallend groß ist die Zahl der Fälle (52), die keine wesentliche degenerative Veränderung des Herzmuskels aufweisen, trotzdem die Kranzgefäße zum Teil eine erhebliche Sklerose zeigen. Weyrich nennt 80 Fälle unter 550 coronarsklerotischen Fällen ohne degenerative Veränderungen. Reuter teilt 55 Fälle mit, die trotz Coronarsklerose keine Herzmuskelveränderungen aufweist hätten, und meint, daß im Vergleich zur vielfach vorhandenen Coronarsklerose die fettige Degeneration und die Herzschielen verhältnismäßig wenig ausgebildet wären.

In 19 Fällen führte die Ruptur des Herzens, und zwar ausschließlich des linken Ventrikels zum plötzlichen Tod. In über der Hälfte der Fälle war die Hinterwand rupturiert. Einmal die Kammerkante des linken Ventrikels! Stets war eine hochgradige Coronarsklerose besonders der linken Gefäße, in 16 Fällen eine frische Thrombose und ferner eine mehr oder weniger ausgebildete Schwielenbildung festzustellen. Fettige Degeneration war nur selten vorhanden. Auch fanden sich Herzaneurysmen und eine allgemeine Atherosklerose. Die Ruptur führte zur pralle

ung des Herzbeutels mit Blut und damit zum Herzstillstand. 19 Fälle sind 12 Männer und 7 Frauen jeglichen Alters ab dem 40. Lebensjahre. Sie stellen 8,1 % aller Herztodesfälle und 6,1 % aller Todesfälle überhaupt dar. Koopmann berichtet 17 Herzrupturen = 3,4 % seiner Herztodesfälle. Er fügt hinzu, daß 10 mal der linke Ventrikel rupturiert war. Das spricht für die Folgerung, die aus den hier angegebenen Fällen gezogen wurde, daß die Rupturen stets im linken Ventrikel sitzen. Dieselbe teilt auch Weyrich mit, daß spontan nur der linke Ventrikel rupturiert und daß im rechten Ventrikel die Ruptur nur dann vorkommt, wenn eine stumpfe Gewalt eingewirkt hat.

Als letztes der Gruppe Coronarsklerose wäre noch ein Fall einer Coronarruptur zu erwähnen. Es handelte sich um einen 45-jährigen Invaliden, der bei der Sektion einen prall mit 420 ccm Blut gefüllten Herzbeutel aufwies. Die Kranzgefäße waren sklerotisiert und verändert, und der Ramus dexter zeigte in seinem Verlauf einen kleinen Einriß der Gefäßwand, aus dem die Verblutung hervorgegangen sein muß, die den sofortigen Tod herbeiführte. Im Anschluß hieran seien noch 2 Fälle näher angeführt, die ebenfalls oben statistisch erfaßt wurden: 1. Ein 27 Jahre alter Soldat, der ohne Beschwerden seinen Dienst tat und plötzlich nach sportlicher Leistung (Fußballspiel), verstarb. Bei der Sektion fand man eine leichte diffuse Atherosklerose der Aorta und einen großen Thrombus in einem atherosklerotischen Geschwür des Truncus descendens coronar. sinister. Und als „Nebenbefund“ waren die übrigen Organe ohne Besonderheiten — fand sich ein Thymus persistens von 38 g. — 2. Ein 68jähriger Beamter, der auf einem Spaziergang tot umfiel. Es fand sich neben flächenhaften Verwachsungen der Lungen mit alten Kalkherden in den Lungen brauner Herzmuskelschwund, ausgedehnte Coronarsklerose, Herzdilatation und eine Struma retrosternalis, deren oberer Lappen apfelgroß war.

Syphilitische und arteriosklerotische Veränderungen der Aorta 1. mit Stenose und 2. ohne Stenose der Abgangsstellen der Kranzarterien:

Die Sektion von 33 plötzlichen Todesfällen ergab syphilitische und arteriosklerotische Veränderungen der Aorta als Todesursache. Das sind 14,1 % aller Herztodesfälle und 10,5 % aller Todesfälle überhaupt. Damit stellt diese Aortenerkrankung neben der Coronarsklerose den Hauptteil der plötzlichen Todesfälle bei Herz-Gefäßerkrankungen. Bedeutend ist auch der Anteil, den die Syphilis als plötzliche Todesursache innerhalb aller Fälle einnimmt. Doch machen die noch zu behandelnden Erkrankungen des Gehirns und seiner Hüllen einen größeren Prozentsatz aller plötzlichen Todesfälle aus innerer Ursache aus. Weyrich,

Woll u. a. halten die Aortitis luica — außer der Coronarsklerose — für die häufigste Ursache des plötzlichen Todes. Koopmann glaubt sogar, daß die Aortenlues besonders zum plötzlichen Tod disponiere, und er führt beweisend an, daß er bei der Sektion von 188 an Herzlähmung plötzlich Verstorbenen 59mal die Diagnose luische Aortitis habe stellen können. Das wäre 31,4 % der sezierten Fälle. Weiter berichtet er über 40 Fälle, an Aortenklappeninsuffizienz gestorben waren, daß bei 55 % Sklerose und bei 45 % Aortitis luica zugrunde gelegen habe. Darf man Koopmann noch 26 Fälle mit, bei denen die Perforation eines Aortenaneurymas, und 17 Fälle, bei denen die Ruptur des Herzens zum Tode geführt hatte; und je zur Hälfte wären syphilitische Veränderungen und Sklerose mit Myofibrosis die Ursache gewesen. Eine andere recht interessante Aufstellung bringt Koopmann noch, in der er über 119 Sektionen berichtet, daß alle Aortitis luica aufgewiesen hätten und von denen 107 = 89,9 % der Fälle an Herzlähmung und die übrigen an Pneumonie, Apoplexi usw. gestorben wären. Auch Weyrich bringt die große Bedeutung des Aortenlues zum Ausdruck und nennt sie bei 32,53 % seiner beschriebenen Herztodesfälle als Ursache des plötzlichen Todes. Nur Thorner und Schneider stellen — wie auch unsere Zahlen zeigen — ein geringeres Auftreten der luischen Aortitis als Todesursache fest. Erstgenannter gibt sie nur 9 % von allen Fällen an.

Die an syphilitischen und arteriosklerotischen Veränderungen der Aorta in Halle Verstorbenen waren 53 Personen = 20 Männer und 13 Frauen; es ist also ein leichtes Überwiegen der Männer festzustellen. Auch Weyrich hat das beobachtet. Schneider dagegen hat Gleichheit der Beteiligung der beiden Geschlechter angegeben. Aus dieser geringen Zahl irgendwelche Schlüsse zu ziehen auf ein gewisses Maximum oder Minimum der Sterblichkeit in einem Lebensjahrzehnt ist nicht möglich. Das 6. Dezennium weist 9 und das 8. 10 Fälle auf, wobei im erstgenannten eine größere männliche und im zweiten eine gleich große Sterblichkeit besteht. Die anderen Fälle verteilen sich auf das 4., 5. und 7. Jahrzehnt. Bei Schneider liegen die Fälle zwischen dem 29. und 65. Lebensjahr. Nach Koopmann haben beide Geschlechter die größte Sterblichkeitsziffer im 3. und 4. Jahrzehnt. Indem Weyrich die verschiedenen Erkrankungen und das Alter vergleicht, kommt er zur folgenden kleinen Aufstellung: Höchste Sterblichkeit an reiner Mesoartitis im 5., an Mesoartitis und Arteriosklerose im 6. und an Coronarsklerose im 7. Dezennium.

1. Syphilitische und arteriosklerotische Veränderungen der Aorta mit Stenose der Abgangsstellen der Kranzarterien:

Während sich die reine Arteriosklerose mit Vorliebe im Aortenbogen ausbreitet, ist es für die Aortitis luica charakteristisch, daß sie sich bereits in der Aorta ascendens findet. Aneurysmen der Aorta noch innerhalb der Herzbeutelblätter und atrophische Veränderungen der Klappen sind die Folge. Im Gegensatz zur Arteriosklerose befällt die Aortenlues nicht den ganzen Verlauf der Kranzgefäße, sondern sie bevorzugt die beiden Abgangsstellen und verengt die Ostien der Coronararterien bis zum völligen Verschuß (Aschoff, Herxheimer). Weyrich berichtet über 235 derartige Fälle, die 21 % der Herztodesfälle bei Frauen ausmachen. Koopmann teilt 46 Fälle mit, bei denen der Tod plötzlich durch Coronarverschuß herbeigeführt wurde; in 35 Fällen war die die Coronarostien befallende Aortitis luica die Ursache. 10 Fälle (7 Männer und 3 Frauen) sind in Halle zur Autopsie gekommen. Ein asthmatischer oder stenokardischer Todesfall hatte bei den sich bisher gesund gefühlten Menschen meistens den plötzlichen Tod herbeigeführt. Oft waren die Abgangsstellen beider Kranzarterien befallen. Schwielige und fettige degenerative Veränderungen des Herzmuskels, Insuffizienz der Aortenklappen und Aneurysmen der Aorta vervollständigten das pathologische Bild.

syphilitische und arteriosklerotische Veränderungen der Aorta ohne Stenose der Abgangsstellen der Kranzarterien:

Diese Gruppe umfaßt 25 Fälle (13 männliche und 10 weibliche). 7 mal waren rein diffuse arteriosklerotische und geringe Arteriosklerotische Veränderungen die Todesursache, während in 18 Fällen die Zeichen einer Lues und Arteriosklerose nebeneinander festzustellen waren. Als Nebebefund ergaben sich unter z. T. recht starke Schwielenbildung und fettige Degeneration des Herzmuskels, Dilatation, Hypertrophie und Aneurysmen des linken Ventrikels, sowie bei einem 71 jährigen Manne ein seitiger Hydrothorax, der besonders rechts stark ausgeprägt war, so daß das Herz nach links verdrängt wurde. In seiner Autopsie hat Lesser auch einen derartigen Todesfall erwähnt. Ist der Meinung, daß eine bruske Bewegung oder ein Hustenstoß genüge, um den plötzlichen Tod herbeizuführen durch Verletzung des Mediastinums und die damit verbundene Verletzung der Vena cava inf., ohne daß eine Herzinsuffizienz vorliegen brauche. — Einmal lag ein rupturiertes Aneurysma im unteren Anteil der Aorta vor, das jedoch durch einen Blutpfropf verschlossen war, so daß kein Blut ausgetreten war. Die beiden in der Höhe des Aneurysmas liegenden Wirbelkörper waren arrodiert und zeigten eine rauhe, unregelmäßige Oberfläche. Beide Ventrikel waren leicht hypertrophisch; die Coronarien zart. — In weiteren 9 Fällen hatte die Ruptur der Aorta dem Leben

ein plötzliches Ende gesetzt. Es waren dies 4 Männer und 5 Frauen, wobei bemerkt werden muß, daß das Halbjahr 1933 und das Jahr 1934 gar keinen derartigen Fall aufwies. 5 mal ergoß sich das Blut in den Herzbeutel und führte durch Herzdrucklähmung den Tod herbei. Die Blutmenge im Herzbeutel betrug bis 660 ccm in einem Falle. Es bestand bei 4 Fällen ein Aneurysma dissecans im aufsteigenden Teil der Aorta mit ausgesprochenen arteriosklerotischen Veränderungen, das schließlich dem Blutdruck nachgegeben hatte. Die Kranzgefäße waren nicht wesentlich sklerotisch verändert, und der Herzmuskel zeigte nur geringe Entartungserscheinungen. Nur im 5. Falle befand sich ein Aneurysma auf syphilitischer Grundlage im Bereich des Aortenbogens — kinderfaustgroß. Der etwa 4 cm lange Riß der Aortenwand saß im Anfangsbereich des Aneurysmas an der Umschlagstelle des Herzbeutels und führte so zur Herztamponade. Kein Aortenklappenlues; ebenfalls waren die Coronargefäße frei. Dort zeigten sich syphilitische Veränderungen an der Aorta descendens und abdominalis mit entsprechendem Aneurysma der Arteria iliaca. Im Gehirn waren keine Blutungen und Erweichungsherde feststellbar. Die übrigen Organe waren ohne Besonderheiten. Es handelte sich um eine 73 Jahre alte Frau, die eines Tages tot aufgefunden wurde.

Im folgenden seien nun noch 4 Fälle erwähnt, bei denen die Aorta nicht in den Herzbeutel, sondern in die Brusthöhle und deren Organe perforiert war. Eine 78jährige Frau und ein 53jähriger Mann wiesen einen gleichsinnigen Befund auf: Ruptur der Brustaorta und Durchbruch in die linke Pleurahöhle auf Grund eines syphilitisch bedingten Aneurysmas. Der letztgenannte Fall sei wegen seiner Besonderheiten näher ausgeführt. Zwei Tage vor seinem Tode hatte der Mann, der über ein eigentümliches Druckgefühl im Brustkorb zu klagen hatte, einen Arzt aufgesucht, der röntgenologisch Lungenkrebs feststellte. Die Sektion ergab kurzgefaßt folgendes: Doppelseitige hochgradige Lungenverwachsungen in Gestalt von festen Strängen. Hämatothorax links (1) zwischen den Verwachsungssträngen. Beiderseitiges Lungenödem. Mesaortitis syphilitica. Mehrfache Aneurysmenbildungen in der Brustaorta, und zwar 1. im aufsteigenden Ast vor dem Abgang der Bogengefäße, 2. kleinapfelgroß unmittelbar nach dem Abgang der Bogengefäße, mit reichlichen Thrombenmassen ausgefüllt (Perforation dieses Aneurysmas in die Lunge (linker Oberlappen und Durchbruch der Blutung aus der Lunge in den Brustfellraum. Blutung aus dem Aneurysma in die Bronchien und Luftröhre. Verschlucken von Blut.) 3. eine Aneurysmabildung dicht oberhalb der Durchtrittsstelle der Aorta durch das Zwerchfell. Dilatation des linken Ventrikels. Die übrigen Organe ohne Be-

erheiten. — Im 3. Falle handelte es sich um eine 76 Jahre
Frau, die morgens angekleidet in einer großen Blutlache vor
unbenutzten Bett liegend tot aufgefunden wurde. Sie soll
an „Lungenblutungen“ gehabt haben. Die Sektion ergab
strangförmige Verwachsungen beider Lungen. Blä-
sische Farbe der Lunge, Leber, Milz und Nieren. Blut im
Munde, Rachen und Speiseröhre! Im unteren Drittel der Speise-
röhre ein knapp pfenniggroßer Schleimhautdefekt, der größten-
tenteils mit Blutgerinnungsmassen verschlossen ist. An der Außen-
wand liegt eine kleinapfelgroße, sackförmige Ausbuchtung der
Aorta an, die z. T. mit Blutgerinnsel gefüllt ist und eine für Sonde
durchgängige Verbindung zur Speiseröhre aufweist. Ausgedehnte
Kalkungen im übrigen Teil der Aorta! Herzkranzgefäße und
Nieren frei! Im Magen finden sich 800 ccm dickflüssiges Blut.
Der nächste Fall ist ein 50 Jahre alter Maurer. Das Sektions-
protokoll gibt kurz folgendes an: Die Lungen sehen blaurot aus
und fühlen sich verhältnismäßig fest an. Das Herz ist weit
größer als die Faust der Leiche und prall mit Blut gefüllt. Hyper-
trophie beider Ventrikel! Die Lungenschlagader ist in ihrem
aufsteigenden Teil der Aorta verdrängt. Insuffizienz der Aortenklappen!
Der aufsteigende Teil der Aorta stellt einen mehr als faust-
großen Sack mit verdickter Wandung dar, der sich nach rechts und
nach hinten überweitet. Der Querdurchmesser beträgt 9 cm. Aus-
gedehnte Arteriosklerose! An der hinteren und linken Wand
des Sackes haften ausgedehnte schwarzrote, thrombosierte Blat-
ten. An einer Stelle ist diese Schichtung von flüssigem Blut
erwühlt, und es findet sich hier eine Durchbruchstelle zur
Lungenschlagader. Die Perforation beginnt, von der Lungen-
schlagader her gesehen, etwa 3 cm oberhalb der Pulmonalklappe
ist markstückgroß mit zerrissenen Rändern.

Als letzter soll noch ein Fall erwähnt werden, bei dem es sich
um die Ruptur eines Aortenaneurysmas handelte, sondern
die Ruptur eines Aneurysma dissecans der Arteria pul-
monalis sinistra. Wegen der Gleichartigkeit der Erkrankung
ist dieser Fall hier aufgenommen. Die Sektion der 68jährigen
Frau ergab folgendes: Kehlkopf und Luftröhre sind mit schaumig-
dunkelrotem Blut angefüllt, ebenso der linke Bronchus und
die linken Oberlappen. Keine Pleuraverwachsungen der Lungen!
In der Arteria pulmonalis des linken Oberlappens findet sich
ein Aneurysma dissecans, das an der Stelle der stärksten Aus-
dehnung eine 5 mm breite Ruptur zeigt, die in einen Bronchus

Auch die Arterien der rechten Lunge sind erweitert und
haben eine schlaffe Wandbeschaffenheit. Die Aorta abdomi-
nalis ist arteriosklerotisch verändert; die Coronarien dagegen
normal.

Im Schrifttum finden sich verschiedentlich Angaben über plötzliche Todesfälle, bei denen die Sektion eine Ruptur der Aorta oder eines Aortenaneurysmas als Ursache ergab und die Hauptschlagader entweder syphilitische oder stark arteriosklerotische Veränderungen aufwies. Koopmann beschreibt 26 Fälle einer perforierten Aortenaneurysmas, die 5,6 % der Herztodesfälle darstellten. Weyrich verzeichnet 72 Fälle einer Aortenruptur mit Hämopericard und 28 Fälle, bei denen der Durchbruch der Aorta nicht in den Herzbeutel, sondern in den Respirationstraktus, die Pleura- und Bauchhöhle, in den Ösophagus und einmal nach außen durch die Brustwand erfolgte. Die verschiedenartigsten Möglichkeiten der Folgeerscheinungen einer Berstung der Aorta sind also gegeben, von denen die innere Verblutung in die Pleurahöhlen (besonders in die linke), die Verblutung nach außen durch den Ösophagus und die Blutaspilation durch die Trachea wohl die häufigsten sind und von denen auch einige Fälle oben angeführt werden konnten. Rupturen der Aorta abdominalis sind wenig zahlreich zu beobachten. Weyrich erwähnt 4 derartige Fälle. Zweimal trat der Tod durch Berstung eines Aneurysmas discans und zweimal infolge Ruptur eines syphilitischen Aneurysmas ein. Ein sicherlich besonders seltenes Ereignis ist der letzte Fall, den Weyrich mitteilt: Verblutung durch die Brustwand nach außen. Zugrunde lag ein Aneurysma der Aorta ascendens auf syphilitischer Grundlage, das durch den Druck einer allmählichen Schwund des Sternums herbeigeführt hatte, und nach Durchreißung der Haut erfolgte der plötzliche Tod. — Ein ähnlicher Fall konnte näher beschrieben werden, bei dem ein syphilitisches Aneurysma zwei Wirbelkörper arrodiiert hatte.

Welches der Grund ist zum Eintritt der Ruptur zu gerade diesem oder jenem Zeitpunkt, ist oft forensisch wichtig, doch nicht immer anamnestisch zu klären. Wie schon erwähnt, spielt die körperliche Anstrengung eine gewisse Rolle. Schneider führt z. B. zwei Aortenrisse darauf zurück, deren Intima nicht syphilitisch verändert war. Derselben Meinung ist auch Weyrich und er führt weiter Beispiele an, wo Status graviditatis, Status menstruationis usw. vorlagen. Als unmittelbare Veranlassung der Überdehnung und Ruptur der Aorta sieht er momentane Blutdrucksteigerungen bei einer mehr oder minder starken, dauernden Hypertension an. Als diese seine Ansicht bestätigend gelten ihm die Nebenfunde, wie allgemeine Arteriosklerose und insbesondere sklerotische Veränderungen der Nierenarterien mit Schrumpfnieren, die auch einige unserer Fälle — doch weniger stark ausgeprägt — aufzeigten.

Herzklappenfehler:

In 7 Fällen führten Herzklappenfehler zum plötzlichen Tod, zwar waren es 4 Männer und 3 Frauen. Sie machen nur 3 % Herztodesfälle aus. Koopmann nennt 3.4 %. Ähnlich Prozentsätze teilen Schneider, Richter, Lochte mit. Weyrich dagegen, der 156 derartige Fälle beschreibt, 13,98 %. Er bezeichnet selbst diesen Satz als sehr hoch und das auf sein zahlreiches Kriegsmaterial zurück. Er hat sich feststellen können, daß plötzliche Todesfälle infolge von Klappenfehlern in den 3 Kriegsjahren doppelt so häufig (15% aller Herztodesfälle aus der Kriegszeit) eintraten, als in Jahren nach dem Kriege (rund 7 % der Herztodesfälle der Kriegszeit). Mit Haberdia ist er der Meinung, daß die geringere Möglichkeit, Herzfehler im Kriege genügend zu kompensieren, diesen hohen Prozentsatz bedinge. Die 7 %, die aus dem Kriegsmaterial errechnet wurden, entsprechen annähernd den Angaben der genannten Autoren.

Von den 4 Männern, die plötzlich ihrem Herzklappenfehler erliegen, standen 2 im 5. und 2 im 8. Dezennium, von den 3 Frauen im 5., 6. und 7. Dezennium. Daraus ist natürlich kein Sterblichkeitsmaximum oder -minimum eines der Geschlechter für irgendein Jahrzehnt zu ersehen. Aufgrund der großen Zahl der Fälle stellte Weyrich einen Höhepunkt der männlichen Sterblichkeit zwischen dem 50. und 60. Lebensjahr fest und der weiblichen zwischen dem 60. und 70. Jahr. Bei fast gleicher Anzahl beider Geschlechter beobachtete er außerdem, daß im 6. Dezennium bedeutend mehr Männer als Frauen und im 7. bedeutend mehr Frauen als Männer gestorben waren. In den anderen Jahrzehnten hatte die männliche Sterblichkeit ein kleines Plus.

Die Veränderungen an den Herzklappen waren 6 mal die Folge einer vernarbenden Endocarditis und 1 mal arteriosklerotisch bedingt. Auch Weyrich konnte feststellen, daß die überlebende Mehrzahl der Klappenfehler (104 von insgesamt 156) auf endocarditischer Grundlage beruhten. In 5 Fällen war die Mitralklappe befallen, in einem die Aortenklappe und im letzten beide genannten Klappen. Der Fehler der Aortenklappe war durch die Ausdehnung der diffusen Arteriosklerose entstanden. Hieraus geht hervor, daß plötzliche Todesfälle infolge Klappenfehler des rechten Herzens gar nicht festgestellt wurden (Weyrich). 4 mal wurde nur eine Insuffizienz der Klappen vor. In den 3 anderen Fällen wies die Mitralklappe eine Insuffizienz und Stenose auf. Entsprechend der geringen Zahl und Bedeutung der Klappenfehler als Ursache eines plötzlichen Todes, auf die u. a. auch Risiko hingewiesen hat, haben sich bei allen Fällen Vitien

auch nur 17 mal wesentlich ausgeprägt als Nebenfund feststellen lassen. Demnach sind ausgesprochene Herzklappenfehler unter unserem Leichengut nicht häufig. Denn wenn sie bei einer Menschen auftreten, werden sie meistens ausreichend kompensiert. Deshalb kann ein Herzklappenfehler nur dann zum plötzlichen Tod führen, wenn die Kompensation keine vollständige ist oder wenn eine Dekompensation eintritt (Beitzke). Zur Erklärung des „plötzlichen Versagens des klappenkranken Herzens“ führt Weyrich die verschiedensten Ursachen und Nebenfunde an, die mittelbar oder unmittelbar auf das Herz einwirken können und die auch von uns beobachtet werden konnten. Einmal lag ein Pleuraerguß vor, 2 mal ein ausgeprägtes Lungenödem, 2 mal arterio- und coronarsklerotische Veränderungen mit mäßiger Schwielenbildung im Herzmuskel, ein weiteres Mal eine erhebliche Dilatation des linken Ventrikels und schließlich eine Hypertrophie und Dilatation des Herzens verbunden mit Schrumpfnieren.

d) Erkrankungen des Herzmuskels und Herzbeutels (ausschließlich der Folgezustände nach Embolie und Thrombose der Kranzarterien des Herzens).

Diese letzte Gruppe der plötzlichen Herztodesfälle umfaßt 19 Fälle. Bei 11 Männern und 8 Frauen lagen Herzbeutel- und Herzmuskelerkrankungen dem plötzlichen Tod zugrunde. Weyrich stellt demgegenüber ein bedeutendes Überwiegen des weiblichen Geschlechts fest, worauf er auch zurückführt, daß der Höhepunkt der Gesamtsterblichkeit nicht wie in seinen bisherigen Gruppen im 6. Jahrzehnt, sondern im 7. Jahrzehnt liegt. Die unsrigen Protokolle ergaben 5 Todesfälle im 4., 2 im 6., 8 im 7., 4 im 8. und 1 Todesfall im 9. Dezennium. In einem Falle fehlte die Altersangabe im Protokoll. Obgleich die Bedeutung dieser Angaben durch die geringe Anzahl der Fälle stark gemindert ist, könnte man darin eine Bestätigung der Statistik Weyrich sehen, daß im 7. Jahrzehnt das Maximum der Sterblichkeit der Herzbeutel- und Herzmuskelerkrankungen liegt.

Nach der Art der Erkrankung ergeben die 19 Fälle dieser Gruppe folgendes Bild:

a) Braune Atrophie des Herzmuskels	6 Fälle
b) Hypertrophie und Dilatation des Herzens	5 Fälle
c) Fettherz	3 Fälle
d) Myocarditis	2 Fälle
e) Verwachsung zwischen Herzbeutel und dem Herzen	1 Fall
f) Spontane Herzmuskelzerreißung	1 Fall
g) Idiopathische Herzhypertrophie	1 Fall

Zur Erklärung der einzelnen Krankheitsfälle sei noch folgendes bemerkt: a) 6 mal ließ sich als Ursache ein schlaffes, leicht atartiertes, braun atrophisches Herz feststellen. Betroffen waren eine 65jährige und eine 81jährige Frau, die beide weitere keinerlei wesentliche krankhafte Veränderungen aufwiesen. Die Coronargefäße waren zart. Bei einer 64jährigen Frau fanden sich ein starkes Lungenödem und beidseitige Pleuratranssudate. In einem anderen Fall — ein 40 Jahre alter Schlosser — zeigte als Nebenbefund eine schleimige Bronchitis, eine leichte Coronararteriose und eine Anomalie: Der Aortenbogen überzog den rechten Hauptbronchus. Im 5. und 6. Fall handelte es sich um eine 65jährige Frau und um einen 74 Jahre alten Postschaffner. Dieser zeigte neben der braunen Atrophie des Herzmuskels eine mäßig ausgeprägte Bronchitis, ein Lungenödem und Nierensteine, und beide zeigten Schrumpfnieren. Zweifellos haben diese Nebenbefunde dazu beigetragen, den plötzlichen Tod bei den letztgenannten Fällen herbeizuführen. — b) Hypertrophie und Dilatation des Herzens waren in 5 Fällen als Todesursache anzusehen. Ein 55 Jahre alter Mann und eine 67 Jahre alte Frau zeigten eine ausgeprägt chronische Dilatation des Herzens, die dann zu einem akuten Lungenödem Anlaß gegeben hatte. Bei einem 64jährigen Manne, der als Nebenbefund Schrumpfnieren aufwies, stimmt dieser pathologische Befund dem der zwei oben genannten Fälle der vorigen Untergruppe in seiner Art sehr nahe. Jene zeigten Schrumpfnieren als Nebenbefund, die — stark ausgeprägt — zur Niereninsuffizienz führen und damit an sich schon zur Todesursache werden können. Nach Sänkeberg sterben Nephritiker entweder an Niereninsuffizienz oder an den Folgen der Hypertension. Diese sind einmal Komplexion und ein anderes Mal Hypertrophie und Dilatation des linken Ventrikels, die wiederum zur Stauung in den Lungen führen und eine sekundäre Hypertrophie und Dilatation auch des rechten Herzens bedingen. Damit ist die Möglichkeit zum plötzlichen Tod gegeben, wie der angegebene Fall zeigt. Beim 5. Fall eines 63 Jahre alten Manne — hatte die Hypertrophie und Dilatation des Herzens zur Bronchitis und zu Lungenödem geführt. Als wesentlichste Komplikation fand sich eine hochgradige Krümmung der Wirbelsäule, die zweifellos den Kreislauf und besonders das Herz belastet hat. Weyrich sieht die Kyphose sogar als das Primäre an und bezeichnet den Tod als „sekundären Herztod“. — c) In 3 Fällen — es waren ein 55 und ein 64 Jahre alter Mann und eine 33 Jahre alte Frau — lag dem plötzlichen Tod ein Fettherz als Ursache zugrunde. Starke Fettansammlung unter dem Peri- und Epicard und eine diffuse Fettvermehrung des Herzmuskels führten neben der vorhandenen

Dilatation und leichten Coronarsklerose zur Herzlähmung. Auch wird die allgemeine Adipositas den Kreislauf zusätzlich erschwert haben. — d) In 2 weiteren Fällen wurde die Myocarditis zur plötzlichen Todesursache. Ein Herd, der zu dieser Infektion hätte Veranlassung geben können, war in einem Falle anatomisch nicht feststellbar. Der andere zeigte Krampfadergeschwüre an beiden Unterschenkeln. Einmal handelte es sich um einen 62 Jahre alten Gärtner, dessen Herzmuskel neben der entzündlichen Komponente Blutungen aufwies und der außerdem ein Lungenödem hatte. Im anderen Falle war es eine 76jährige Frau, die neben einer schwierigen Myocarditis eine mäßige Coronarsklerose zeigte. — e) Verwachsung zwischen dem Herzbeutel und dem Herzen führte einmal den plötzlichen Tod herbei, und zwar bei einer 70 Jahre alten Frau, die auch eine erhebliche Fettleibigkeit zeigte. Anamnestisch war nichts darüber zu erfahren, ob die Herzbeutelverwachsung nicht schon zu irgendwelchen Beschwerden geführt hatte, wie es ja wohl anzunehmen wäre. Nur selten dürfte sie symptomlos verlaufen. Kolisko hält dies für möglich durch eine außerordentliche Anpassungsfähigkeit der Herzfunktion, so daß dann der Tod eines Tages überraschend eintreten könnte. In dem oben angegebenen Falle wäre es auch denkbar, daß die Beschwerden, die jede Adipositas mit sich bringt, die vielleicht vorhanden gewesenenen Symptome der Herzbeutelverwachsung überdeckt haben und so von der betreffenden Frau nicht gewertet worden sind. Die Verwachsung zwischen dem Herzbeutel und dem Herzen war eine diffuse, aber nicht allzu feste. Es fanden sich außerdem eine Coronarsklerose leichteren Grades und Stauungsorgane. — f) Ein 51 Jahre alter Schlosser war in einem Anfall psychomotorischer Unruhe verstorben. Vorangegangen war ein Streit, so daß die Aufklärung dieses Falles durch eine Sektion forensisch wichtig war. Als eigentliche Ursache des plötzlichen Todes konnten feinste Zerreißen des Herzmuskels und Blutungen in diesen festgestellt werden. — g) Als letzte aller Herz-Gefäßerkrankungen wäre die idiopathische Herzhypertrophie mit Dilatation zu nennen, die einen Mann nicht bekannten Alters betraf. Als Nebebefund ergaben sich Lungenödem und -blähung. Auch Weyrich führt einen derartigen Fall an und weist darauf hin, daß plötzliche Todesfälle durch idiopathische Herzhypertrophie äußerst selten wären und die Diagnose nur gestellt werden dürfte, wenn alle übrigen Ursachen für eine Herzhypertrophie wie z. B. Klappenfehler, Herzmuskelentzündungen, Gefäß-, Schilddrüsen- oder Nierenerkrankungen ausgeschlossen werden könnten.

Mit dieser 4. Untergruppe, den Erkrankungen des Herzmuskels und Herzbeutels (ausschließlich der Folgezustände nach Embolie


und Thrombose, der Kranzgefäße des Herzens) hat die große Gruppe der Erkrankungen des Herzens, seiner Gefäße und der Aorta ihren Abschluß gefunden. 255 von 314 plötzlichen Todesfällen umfaßte sie. Damit stellen die Herz-Gefäßerkrankungen einen Prozentsatz von 74,9 % aller Erkrankungen dar und sind so die bedeutendste plötzliche Todesursache. Eine weitere wesentliche Feststellung konnte gemacht werden: 74,9 % aller Herz-Gefäßerkrankungen waren sklerotische Veränderungen der Kranzgefäße des Herzens oder ihre Folgezustände. Nur 25,1 % machten die Erkrankungen der übrigen 3 Untergruppen aus. 176mal war die Coronarsklerose die Ursache zum überraschenden, plötzlichen Tod. Das besagt, daß sie nicht nur die häufigste Herz-Gefäßerkrankung ist, sondern die häufigste Erkrankung überhaupt, die unerwartet zum Tode führen kann. Denn die übrigen 4 Krankheitsgruppen, die in der Besprechung jetzt folgen werden, weisen erheblich weniger Todesfälle auf.

B III. Erkrankungen des Gehirns und seiner Hüllen (34 Fälle)

In unserem Material fanden sich 34 Todesfälle, welche auf Erkrankungen des Gehirns und seiner Hüllen zurückzuführen waren. Die an „Hirn- und Schädelerkrankungen“ Verstorbenen, wie sie Weyrich auch nennt, stellen 10,8 % aller plötzlichen Todesfälle dar. Koopmanns Material waren sie etwa mit 6 % an der Gesamtzahl beteiligt und bei Weyrich mit 8,88 %. Annähernd gleichhohe und etwas höhere Prozentsätze teilen Schneider, Markovin und Pöder mit, so daß man im allgemeinen sagen kann, daß bei rund 10 % der unerwartet eingetretenen Todesfälle Erkrankungen des Gehirns und seiner Hüllen die Ursache sind. Die Auszählung der 34 Fälle nach den beiden Geschlechtern ergab die Beteiligung von 20 Männern und 14 Frauen, was einem Verhältnis von 59 % zu 41 % entspricht. Die männliche Bevölkerung war also erheblich mehr betroffen von den Gehirntodesfällen als die weibliche. Im Gegensatz hierzu konnte Weyrich ein Überwiegen des weiblichen Anteiles feststellen, und zwar um 4,6%. Er folgerte daraus, da nur die Gehirnerkrankungen in seinem Material ein Mehr an Frauen aufwiesen, daß das weibliche Geschlecht in höherem Maße zum plötzlichen Gehirntod disponiert sei. Unsere Fälle bestätigen diese Ansicht nicht, wenn gleich betont werden muß, daß die Frauen einen größeren Prozentsatz ihrer Gesamtheit ausmachen, als die Männer, nämlich 13,3% gegen 9,6%. Leider fehlen in den genannten anderen Arbeiten irgendwelche Angaben über die geschlechtliche Beteiligung, um weitere Schlüsse ziehen zu können. Eine Verteilung der Todes-

fälle auf die einzelnen Lebensjahrzehnte ist aus nachstehender Zusammenstellung ersichtlich: Es starben im:

	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9. Dezennium
Männer:	2	2	3	3	3	2	2
Frauen:		2	1	3	2	4	
Insges.:	2	4	4	6	5	6	2



In den Protokollen fehlten die Altersangaben von 3 Männern und 2 Frauen, so daß nur 29 Fälle in der Aufstellung verwertet werden konnten. Es wäre hervorzuheben, daß sich über die Hälfte der Gehirntodesfälle zwischen dem 51. und 80. Lebensjahre ereignet haben. Dieselbe Feststellung hat auch Weyrich machen können. An den 257 Fällen seines Materials, die an Hirn- und Schädelkrankungen unerwartet verstorben waren, hat er einen Sterblichkeitshöhepunkt für beide Geschlechter im 6. Dezennium beobachtet. In dieser Zeit traten 50.8 % der Fälle auf.

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	November	Dezember
Männer:	5	2	1	2	1	1	1	1			3	3
Frauen:		1	2	2	1	1		1	2	4		
Insges.:	5	3	3	4	2	2	1	2	2	4	3	3

Die Auszählung der Fälle nach den Monaten, in denen der plötzliche Tod erfolgte, zeigt eine ziemlich gleichmäßige Verteilung auf das ganze Jahr. Doch findet sich in den Sommermonaten Mai–September ein Rückgang in der Zahl der Fälle; in der Zeit von November bis Januar hat sich kein weiblicher Todesfall ereignet, während die Männer in diesen Monaten die meisten Opfer

beklagen haben. Es ist anzunehmen, daß diese Unterschiede auf die kleine Zahl der Fälle zurückzuführen sind. Fast $\frac{2}{3}$ der Todesfälle erfolgten im kälteren Halbjahr. Diese Beobachtung stimmt mit der Weyrichs überein, daß in die kalte Jahreszeit der höchste Prozentsatz der Sterblichkeit fällt. — Die 34 plötzlichen Hirntodesfälle konnten pathologisch-anatomisch in folgende Untergruppen eingeteilt werden:

Spontane Hirnblutung;
Spontane intermeningeale Blutung;
andere Erkrankungen des Gehirns und seiner Hüllen.

Spontane Hirnblutung:

Bei 22 Fällen = 65 % der Gehirntodesfälle ergab die Sektion eine Gehirnblutung als Ursache des überraschenden Todes. Auch andere Autoren bezeichnen die Hirnblutung als die bei weitem häufigste und bedeutendste Gehirn- und Schädelerkrankung. In unserem Material macht die Hirnblutung 7 % aller Erkrankungen aus, die unerwartet zum Tode geführt haben. Koopmann gibt ihr Vorkommen mit 5,6 % an, Weyrich nur mit 4,9 %. Pöcker, Markovitch u. a. verzeichnen ähnlich niedrige Prozentwerte. In erheblich größerem Maße war das männliche Geschlecht dieser Untergruppe beteiligt als das weibliche (auch bei Weyrich). Es wurden 13 Männer = 59 % und 9 Frauen = 41 % zählt. Die Untersuchung nach dem Alter ergab, daß — entsprechend der Zusammenstellung der Hauptgruppe — die meisten Todesfälle jenseits des 50. Lebensjahres erfolgt waren. Weyrich berichtet ebenfalls, daß sich die Hirnblutungen vorwiegend bei Personen ereignen, die das mittlere Lebensalter bereits überschritten haben, während demgegenüber Aschoff die meisten hierdurch bedingten plötzlichen Todesfälle zwischen dem 20. und 35. Lebensjahr gesehen hat. Vielleicht läßt sich dieser Unterschied dadurch erklären, daß Aschoff zu den plötzlichen Todesfällen auch Fälle rechnet, die in unbemerkt gebliebenen chronischen Traumen ihre Ursache haben.

Die Sektionen dieser Todesfälle ergaben, daß Rupturen mittlerer und kleinerer Gefäße, die z. T. recht stark sklerotisch verändert waren, die tödlichen Gehirnblutungen verursacht hatten. Die Blutungsherde fanden sich in 17 Fällen in den Stammganglien oder im Bereich der Capsula interna und waren meistens in den 3. und 4. Hirnventrikel durchgebrochen. Nur einmal erfolgte ein Durchbruch nach außen, und zwar durch die Fissura Sylvii. Überwiegend war die linke Gehirnhälfte befallen, wie es auch Weyrich und Koopmann berichten. Zweimal lag eine Arterien-Blutung vor mit Durchbruch in den 4. Ventrikel. Je einmal fand man eine Blutung im linken Occipitallappen und in der

Inselgegend des rechten Parietallappens. Im letztgenannten Falle war die Todesursache eine Hirndrucklähmung infolge Durchblutungsblutung aus einem Aneurysma der Arteria basilaris in der 3. Ventrikel. Aus diesen kurzen Aufzeichnungen ist zu ersehen, daß die Blutungen hauptsächlich im Großhirn saßen.

Da bekanntlich im allgemeinen der Hochdruck die Voraussetzung schafft für diese Hirnblutungen, wurden die Protokolle nach den Nebenerkrankungen durchgesehen. Es konnte festgestellt werden, daß das Gefäßsystem aller Fälle eine diffuse Arterio- und Coronarsklerose zeigte. Nur selten fehlte eine Hypertrophie des Herzens. Ausgesprochene Schrumpfnieren waren nicht immer vorhanden; doch konnten stets entzündliche und sklerotische Veränderungen des Nierenparenchyms wenigstens mäßigen Grades festgestellt werden. Es wurde bereits bei der Besprechung der Herz-Gefäßerkrankungen darauf hingewiesen, daß Nephritiker — sterben sie nicht an Niereninsuffizienz — entweder durch eine Hypertrophie des Herzens oder durch einen apoplektischen Insult ad exitum kommen (M ö n c k e b e r g). Diese gleichen wesentlichen Nebebefunde konnten auch andere Autoren in ihrem Material machen. Daß außerdem andere pathologische Befunde ebenfalls ihren Beitrag leisten zum plötzlichen Tod, ist wohl anzunehmen. So lagen 2 mal frische endocarditische Veränderungen an der Mitrals vor. Ferner fanden sich Lungenödem und -emphysem, Herdpneumonie, Bronchitis, Carcinose der Lunge, Pleuraverwachsungen u. a.

b) Spontane intermeningeale Blutung:

Fünfmal war die Hirnhautblutung die plötzliche Todesursache. Es waren 4 Männer und 1 Frau, die alle jünger als 50 Jahre alt waren. Diese 5 Fälle stellen 14,7 % der Hirntodesfälle dar. Bei Weyrich macht diese Untergruppe 29,1 % aus. Auch überwiegt die Zahl der Frauen bei den von ihm angegebenen 69 Fällen ganz beträchtlich. Diese Unterschiede sind auffallend; doch lassen sie sich durch die geringe Zahl unseres Materials erklären.

Bei verschiedenen Autoren finden sich Bemerkungen über die nicht seltene Ursache des plötzlichen Todes durch intermeningeale Blutungen (Haberda, Kolisko, Szekely u. a.). Bereits im Jahre 1894 erschien von v. Hofmann eine ausführliche Arbeit über die Ruptur des Aneurysmas einer Hirnbasisarterie. Die Meinungen darüber sind verschieden, ob die Aneurysmarupturen vorzüglich das Basilarisgebiet oder das Carotisgebiet betreffen. Weyrich, Szekely und auch v. Hofmann haben im letztgenannten Bereich meistens die Ruptur gefunden. Von unserem Material zeigten 3 Fälle eine rupturierte Arteria basilaris. Bei

den beiden anderen Fällen war einmal die Arteria cerebri media und einmal die Arteria communicans anterior des Carotisgebietes betroffen. Die Hirngefäße dieser Fälle waren alle allgemein sklerotisch verändert. Die gleichen Nebenerkrankungen wie bei der vorhergehenden Untergruppe deckte die Sektion auch hier auf: Arterio- und Coronarsklerose, Hypertrophie und Dilatation des Herzens, Schrumpfnieren und Lungenödem. Für die spontanen Hirnblutungen und intermeningealen Blutungen spielen — neben der Hypertension — die gleichen Gelegenheitsursachen selbstverständlich eine maßgebliche Rolle, wie für die Aortenrupturen und ähnliche Fälle. Seelische und körperliche Belastungen dürfen auch hier der eigentliche Anlaß zur plötzlichen Gefäßruptur sein. In unserem Material ist z. B. ein Todesfall durch intermeningeale Blutung verzeichnet, bei dem diese während des Coitus eintrat.

c) Andere Erkrankungen des Gehirns und seiner Hüllen:

Diese letzte Untergruppe umfaßt 7 Fälle, 3 männliche und 4 weibliche. Pathologisch-anatomisch lassen sie sich folgendermaßen gliedern:

1. Akute Hirnschwellung	2 Fälle
2. Geschwülste	2 Fälle
3. Eitrige Meningitis	1 Fall
4. Encephalitis	1 Fall
5. Embolie einer Hirnarterie	1 Fall.

1. Akute Hirnschwellung: 2 Fälle sind hier zu nennen. Es waren ein 27jähriger Wachtmeister und ein 34jähriger Werkmeister, die beide plötzlich während des Dienstes umfielen, ohne vorher Beschwerden gehabt zu haben. Im ersten Falle zeigte die Sektion als einzigen pathologischen Befund ein akutes Hirnödem. Im anderen Falle ergab sie dasselbe und eine allgemeine Cyanose aller inneren Organe, Leberverfettung und follikuläre Hyperplasie der Milz.

2. Geschwülste: 2 Protokolle gaben Gliome des Gehirns als plötzliche Todesursache an. Durch Hirnödem und Hirndruck war der Tod eingetreten. Das eine Gliom fand sich im Marklager der rechten Hemisphäre, das andere in der weißen Substanz der linken Hirnhälfte und hatte die rechte Hemisphäre und den linken Ventrikel verdrängt. Arteriosklerose und Lungenödem vervollständigten den Sektionsbefund. Es handelte sich um eine 56 und um eine 71jährige Frau.

3. Eitrige Meningitis: In einem Falle — bei einem 30 Jahre alten Mann — ergab die Sektion als Ursache des plötzlichen Todes eine

eitrige Meningitis. Eine Stirnhöhleneiterung, die unbemerkt geblieben war, hatte zu einem Stirnhirnabszeß links geführt, von dem die tödliche Meningitis ihren Ausgang genommen hatte.

4. Encephalitis: Bei einer Frau unbekannten Alters stellte sich als Ursache des überraschenden Todes eine bohngroße Blutung in den linken Zentralknoten heraus, die in einer Encephalitis begründet lag. Die linke Hälfte der Kleinhirnrinde zeigte sich stark erweicht. Anamnestiche Angaben über einen Gehirnschlag oder eine infektiöse Erkrankung waren nicht zu erlangen.

5. Embolie einer Hirnarterie: Kolisko, Weyrich u. a. weisen darauf hin, daß durch Embolie einer Hirnarterie nur selten der plötzliche Tod einträte. Dies habe seinen Grund einmal darin, daß meistens Hirnbezirke von der Zirkulationsstörung betroffen werden, deren Schädigung nicht unbedingt den Tod zur Folge hat, und zweitens, daß die unverzügliche Ausbildung eines Kollateralkreislaufes ebenfalls den Eintritt des Todes verhindere. Weyrich hat einen tödlichen Emboliefall der Arteria cerebri media beschrieben, Richter und Kolisko je einen der Vertebralarterie, Reuter einen der Arteria basilaris. Einen Parallellfall zu unserem hat A. Dumas mitgeteilt: Die Thrombose der Arteria fossae sylvii. Dieses Gefäß wies auch in unseren Falle den Embolus auf. Pathologisch-anatomisch wichtig ist noch eine alte Endocarditis, die sich im linken Vorhof des Herzens fand.

BIV. Erkrankungen des Respirationsapparates (28 Fälle)

Bei plötzlichen Todesfällen lagen Erkrankungen des Respirationstraktes dem überraschenden Ableben der betreffenden Personen zugrunde. Das wären 8,9% aller 314 Todesfälle des Gesamtmaterials. Bei dieser geringen Zahl von Fällen sind die Lungenerkrankungen in dieser Statistik nicht (wie bei Weyrich, Koopmann u. a.) nächst den „Erkrankungen des Herzens, seiner Gefäße und der Aorta“ die häufigste Ursache, die zum unerwarteten Tode führte. Wir sahen bereits, daß eine andere Hauptgruppe: „Erkrankungen des Gehirns und seiner Hüllen“ einen etwas höheren Prozentsatz (10,8%) aller Fälle ausmacht. Gegenüber den Herz-Gefäßerkrankungen jedoch, die ja 74,9% des gesamten Materials darstellen, erscheinen die Lungenerkrankungen in ihrer kleinen Zahl als plötzliche Todesursache weniger bedeutungsvoll. Merkel und Schneider teilen gleichfalls ein geringes Vorkommen von Erkrankungen der Atmungsorgane als Ursache zum plötzlichen Tod mit und nennen beide einen Satz von 14% aller Fälle, während Koopmann 22,4% angibt und Weyrich sogar 23,36%. Die beiden letz-

enannten Autoren verzeichnen also ein erheblich häufigeres Auftreten der Lungenerkrankungen als die erstgenannten. Eine Erklärung hierfür ist schwerlich zu geben. Weyrich sieht den Grund einfach darin, daß er, wie Koopmann eine viel größere Zahl von Fällen statistisch erfassen konnte, als die anderen Autoren.

Eine Betrachtung der 28 Fälle betreffs der Beteiligung der beiden Geschlechter ergab, daß 16 Männer und 12 Frauen an Lungenerkrankungen plötzlich verstorben waren. Das entspricht einem prozentualen Verhältnis von 57,1 % für die Männer und 42,9 % für die Frauen. Weyrich konnte ebenfalls ein leichtes Überwiegen der männlichen Bevölkerung feststellen. Er errechnete einen männlichen Anteil von 54,4 % und einen weiblichen von 45,6 % und kommt so den hier angegebenen Zahlen sehr nahe. Recht interessant ist es nun, die 16 Männer und 12 Frauen in Beziehung zu setzen zu der Gesamtzahl der beiden Geschlechter. Die erstgenannten stellen 7,7 % aller Männer dar und die anderen 1,4 % aller Frauen. Der weibliche Prozentsatz ist also ein größerer im Gegensatz zu den Herz-Gefäßerkrankungen, an denen 78,9 % aller Männer, aber nur 66,7 % aller Frauen gestorben waren. Somit betraf — prozentual am Gesamtleichenanteil — der plötzliche Tod durch Erkrankungen des Respirationsaktes mehr Frauen als Männer. Untersucht man nun die einzelnen Fälle nach ihrem Lebensalter und zählt sie getrennt nach den beiden Geschlechtern aus, so ergibt sich folgendes Bild:



In dieser graphischen Darstellung konnten nur 13 männliche Fälle verwertet werden, da bei 3 Männern die Altersangaben in den Protokollen fehlten. Die absoluten Zahlen, die dieser Darstellung zugrunde liegen, seien nachstehend wiedergegeben. Es waren im

	3.	—4.	—5.	—6.	—7.	—8.	—9. Dezennium
Männer:	2	1	3	2	4	1	
Frauen:	1	1	2	3	5		
Insges.:	3	2	5	5	9	1	

Das Maximum der Sterblichkeit liegt im 8. Jahrzehnt. Die graphische Darstellung verzeichnet ein konstantes Ansteigen der Zahl der Todesfälle vom 3. bis zum 8. Dezennium, um dann sehr stark abzufallen im 9. Dezennium. Ganz entsprechend diese alle 25 Fälle darstellenden Kurve verläuft die Kurve, die nur die Beteiligung der Frauen wiedergibt. Auch sie weist ihren Höhepunkt im 8. Lebensjahrzehnt auf, um dann im 9. schon gar keinen Todesfall mehr anzuführen. Etwas anders verhält sich die den männlichen Anteil wiedergebende Kurve: Ansteigen vom 3. bis zum 6. Jahrzehnt — Konstantbleiben der Häufigkeit der Fälle — und ebenfalls rasches Abfallen im 9. Dezennium. Vergleicht man nun dieses graphische Bild mit dem, das die Gesamtsterblichkeit wiedergibt, und dem, das die Sterblichkeit an Herz- Gefäßerkrankungen und an Hirnerkrankungen darstellt, so sieht man übereinstimmend das Maximum der Todesfälle beider Geschlechter im 8., das der Männer allein im 6. und das der Frauen im 8. Lebensjahrzehnt. Es ergibt sich so eine ständige Zunahme der Zahl der Todesfälle an Lungenerkrankungen mit dem höheren Alter, wie sie auch Weyrich hat beobachten können. Koopmann teilt eine die Sterblichkeit an Pneumonie darstellende Kurve mit, die von dem 1. bis 4. Jahrzehnt abfällt, sich bis zum 7. auf gleicher Höhe hält, um dann anzusteigen.

Um einen Überblick über den Einfluß der jahreszeitlich verschiedenen klimatischen Verhältnisse zu bekommen, sei folgende Aufstellung wiedergegeben, die die Höhe der Sterblichkeit in den einzelnen Monaten aufzeigt. Schon oben wurde darauf hingewiesen, daß Weyrich der Meinung ist, daß besonders die Erkrankungen des Respirationstraktes in ihrem Verlauf durch die Witterung beeinflusbar sind. Er verzeichnet den Höchststand der Sterblichkeit (15 %) im Februar. Von diesem Monat ab fällt die Sterblichkeitsziffer — mit Ausnahme eines kleinen Anstieges wieder im April — und erreicht im August ihren Tiefstand, um dann wieder allmählich zuzunehmen bis zum Februar. Die 28 Todesfälle dieser Statistik verteilen sich — getrennt nach ihren Geschlechtern — folgendermaßen auf die 12 Monate:

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	November	Dezember
Männer:	1	3	1	3	2	1	—	1	1	1	1	1
Frauen:	4	2	—	2	2	—	—	—	—	1	—	1
Gesges.:	5	5	1	5	4	1	—	1	1	2	1	2

Die Monate Januar und Februar weisen das Maximum an Todesfällen auf. Es folgt — entsprechend der Mitteilung Weychs — nach einem Abfall im März ein neuerlicher Anstieg bis zum Höhepunkt im April, um dann wieder abzufallen und im Juli das Minimum zu erreichen, der gar keinen Todesfall aufweist. Diesem Tiefstand folgt ein langsames Ansteigen der Sterblichkeitsziffer bis zum Dezember. Dieses selbe Bild findet man nähernd bei der Betrachtung der Verteilung der beiden Geschlechter auf die einzelnen Monate. Koopmann spricht von Höhepunkten, die die Sterblichkeit an Pneumonie aufzuweisen haben: Dezember-Januar, März-April, Juni-Juli und Oktober. Obgleich zu berücksichtigen ist, daß nur eine Krankheit der Betrachtung unterzogen worden ist, sind Koopmanns Angaben unserem Material nicht zu bestätigen. Der Juni, Juli und Oktober weisen in der obigen Aufstellung nur vereinzelte Todesfälle auf. Ebenfalls zeigt sich der März wenig einflußreich auf die Lungenerkrankungen. Dagegen könnte man im April und Mai in einem Sterblichkeitshöhepunkt sprechen, und ebenfalls im Januar und Februar. Die 2 eben genannten Monate verzeichnen Todesfälle, die 35,7 % darstellen. Die männlichen Fälle allein machen in diesen Monaten weniger aus (25 %); doch starben die Hälfte der Frauen im Januar und Februar. So scheint die Wirkung in diesen 2 Monaten und im April-Mai eine wesentliche Einwirkung auf die Erkrankungen des Respirationstraktes zu haben.

Nach pathologisch-anatomischen Gesichtspunkten konnten die Fälle dieser Hauptgruppe in folgende Untergruppen eingeteilt werden:

- a) Pneumonie und Pleuritis
- b) Bronchitis
- c) Thromben-Embolie der Arteria pulmonalis
- d) Lungentuberkulose
- e) Übrige Lungentodesfälle.

Pneumonie und Pleuritis:

Es wurden 10 Fälle gezählt, bei denen diese Erkrankung zum tödlichen Tod geführt hatte. Somit stellen sie 35,7 % der an

Erkrankungen des Respirationstraktes Verstorbenen dar und sind die häufigste Erkrankung dieser 3. Hauptgruppe. Über ein fast ebenso zahlreiches Vorkommen berichten Schneider und Markovin. Weyrich hat 267 Pneumoniefälle gezählt, die 42,38 % der Lungenerkrankungen ausmachten, und Koopmann nennt sogar 73,1 %, einen auffallend hohen Prozentsatz, der wohl sicherlich z. T. darauf zurückzuführen ist, daß er kindliche Todesfälle mit in seiner Statistik aufgenommen hat.

Unsere 10 Fälle waren 4 Männer und 6 Frauen, also ein leichtes Mehr des weiblichen Geschlechtes. Demgegenüber hat Weyrich beobachtet, daß das männliche Geschlecht weit stärker vertreten war. Nun sind die hier angegebenen Fälle zahlenmäßig zu wenige, als daß sie über die Beteiligung der beiden Geschlechter etwas Bestimmtes aussagen könnten. Bei einer Untersuchung des Sterbealters ergab sich, daß sich bei den Frauen je 1 Todesfall am Ende des 4. und im 5. Dezennium ereignete, alle übrigen Fälle vom 60. Lebensjahr ab. 5 Todesfälle erfolgten in den vorher genannten Wintermonaten und 4 im 2. Höhepunkt der Sterblichkeit (April-Mai).

Bei 4 Fällen lag als Lungenerkrankung eine genuine Pneumonie vor. Es waren 4 Frauen. Stets war entweder der rechte oder der linke Lungenunterlappen befallen. Einmal fand sich außerdem eine frische, eitrig-fibrinöse Pleuritis, die wohl wesentlich neben den anderen Befunden zum Eintritt des plötzlichen Todes beigetragen hat. — Eine Bronchopneumonie sah man bei 3 Fällen, die einmal mit einer Bronchitis und einmal mit einem Lungenemphysem verbunden war. Es handelte sich um 2 Männer und 1 Frau. — Ferner waren bei 2 Fällen eine chronische Pneumonie, deren eine durch pleuritische Verklebungen und Verwachsungen kompliziert war, — und im letzten Falle eine hypostatische Pneumonie die Todesursache. Doch ist wohl kaum anzunehmen, daß die genannten pneumonischen Erkrankungen allein verantwortlich zu machen sind für den plötzlichen Tod. Vielmehr sah man bei allen Fällen mehr oder weniger stark ausgeprägte Nebenefunde, die in ihrer Wirkung die eigentliche Todesursache unterstützt haben. Koopmann ist der Meinung, daß der Pneumonietod meistens ein Herztod sei, indem Herz und Gefäße toxisch gelähmt würden. Umso eingreifender muß diese Wirkung sein, wenn arteriosklerotische und coronarsklerotische Veränderungen, Klappenfehler und Herzdilatation vorliegen. Weiterhin fanden sich einmal Schrumpfnieren, dann alte, kreidige Tuberkuloseherde und Lungenödem und 3 mal ein reduzierter Ernährungs- und Kräftezustand. Letztgenannten Nebefund macht besonders Weyrich mit verantwortlich für das Eintreten des überraschenden Todes.

Bronchitis:

2 Männer und 2 Frauen starben an einer Bronchitis, und zwar schließlich an einer eitrigen. Im 60. Lebensjahr verschied ein Mann, der die schwersten krankhaften Zeichen aufwies. Die übrigen 3 Personen ereilte der Tod alle im 8. Dezennium. Weyrich teilt mit, daß bei den von ihm beschriebenen 69 Fällen der Tod erst nach dem 41. Lebensjahr eintrat und daß dann mit dem Alter die Sterblichkeitsziffer zunahm. 11,7 % aller Lungenkrankungen bestritten diese Fälle. Bei Koopmann nur 2,3 %, und diese waren auch nur Kinder. Unsere 4 Bronchitisfälle machen 3 % der Erkrankungen des Respirationstraktes aus und stimmen so mit dem Prozentsatz Weyrichs überein. Schon bei den Herz-Gefäßerkrankungen wurde darauf hingewiesen, daß einige Fälle die Bronchitis als Nebenfunde zeigten, und gesagt, daß diese zweifellos mitgewirkt hat, den Tod unerwartet herbeizuführen. Bei diesen Bronchitisfällen ist es nun dementsprechend umgekehrt. Arterio- und Coronarsklerose, schwierige Entartung des Herzmuskels, Herzhypertrophie, Bronchiektasien und Pleuraerwachsungen sind die Nebenfunde, die den akuten Krankheitszustand der Betroffenen erschwerten und die auch Weyrich z. T. mitteilt.

Thromben-Embolie der Arteria pulmonalis:

Viermal erfolgte der plötzliche Tod durch Embolie der Lungenarterie. Einmal waren beide großen Lungengefäße verstopft, ein weiteres Mal nur das linke Gefäß und in den beiden anderen Fällen die mittleren Verzweigungen der rechten Seite. Coronarsklerose, Hypertrophie und Dilatation des Herzens und Lungenödem waren die Begleiterscheinungen. Betroffen von der Embolie waren 2 Männer im 40. und 46. Lebensjahr, 1 Mann im 72. und 1 Frau im 79. Jahr. Woher der Embolus im jeweiligen Falle kam, war nur 2 mal auszumachen; einmal wurde eine Thrombose der Vena uterina festgestellt und ein anderes Mal der Plexus prostaticus. Schneider hat 8 mal eine Thromben-Embolie der Arteria pulmonalis als plötzliche Todesursache beobachtet können; in 2 Fällen war die Vena femoralis der Ursprungsort des Embolus gewesen. 2 Fälle teilt Koopmann mit, die nur 1,2 % der Lungentodesfälle ausmachten gegenüber den 15 %, die die hier aufgeführten Fälle darstellen. Weyrich hat 7,54 %. Davon gehörten über $\frac{2}{3}$ dem weiblichen Geschlecht an, die sich im allgemeinen auf alle Lebensjahre verteilten, während sich bei den Männern Emboliefälle besonders im 6. und 7. Dezennium feststellen ließen. Am häufigsten waren nach Weyrich die Beinvenen an der Thrombose beteiligt, und von

diesen wiederum besonders die Vena femoralis beiderseits, wie es ja auch Schneider angibt.

d) Lungentuberkulose:

Auch diese Untergruppe weist 4 Fälle auf, 2 männliche und 2 weibliche: also 14,3 % aller Lungentodesfälle. Bei Koopman betraf die Tuberkulose 16,4 % und bei Weyrich sogar 33,71 % der Fälle, die an Erkrankungen des Respirationstraktes verstorben waren. Er führt dies wiederum auf die schlechteren Lebensbedingungen in den Kriegsjahren zurück, aus denen der Großteil seines Materials stammt. In seiner Arbeit über den plötzlichen Tod vertritt er die Meinung, daß als engere Ursache des unerwartet eintretenden Todes bei den Fällen mit tuberkulösen Lungenleiden in erster Linie das Erlahmen des sekundär erkrankten Herzens anzusehen ist, und er führt beweisend die zahlreichen Nebenfunde an. Erst in zweiter Linie käme die Hämorrhagie aus einer tuberkulösen Lungenkaverne mit Hämoptoe als engere Todesursache in Frage. Bei zwei Fällen unseres Materials, einer 62jährigen Frau und einem 69 Jahre alten Beamten, lag einer frischen Aussaat in beiden Lungenoberlappen eine alte Tuberkulose ohne Kavernenbildung zugrunde. Eine mäßige Coronarsklerose mit leichter Verschielung des Herzmuskels war der Nebenfund in beiden Fällen. Der Mann wies jedoch noch einen Pleuraerguß links auf, der eine starke Verdrängung des Cor nach rechts zur Folge hatte, und außerdem war er Alkoholiker. Eine progrediente Tuberkulose zeigten eine 58jährige Frau und ein Sattler unbekannten Alters, die zur Arrosion eines Lungengefäßes in einer Kaverne geführt hatte und damit zur Blutung und Erstickung der beiden Menschen. Am Herzen waren nur sehr geringe coronarsklerotische und degenerative Veränderungen festzustellen. Nach Weyrich, der 210 Fälle untersucht hat, erfolgten die meisten Todesfälle im Monat April, und bereits im 4. Dezennium war die Sterblichkeitsziffer recht hoch, die bis ins 6. Jahrzehnt hinein weiter anstieg, um dann langsam abzufallen. Auch die hier angegebenen Todesfälle ereigneten sich in dieser Zeit.

e) Übrige Lungentodesfälle:

Diese letzte Untergruppe umfaßt 6 plötzliche Todesfälle: 5 Männer und 1 Frau. 5 mal lag ein Bolustod vor, und einmal war ein Mediastinaltumor die Ursache des unerwarteten Todes. Ein 40jähriger Mann war der Träger dieses Tumors, eines Lymphosarkoms, das von den Bronchial- und Hilusdrüsen ausgegangen war und den ganzen Hilus erfaßt hatte. Eine Metastase fand sich im linken Nebennierenmark. Es war noch eine Pneumonie und

uritis hinzugetreten, die wohl den Anlaß zum plötzlichen Tode.

Weyrich hat zwei plötzliche Todesfälle durch Fremdkörperaspiration beschrieben. Beide Male hatte sich ein größeres derbes Fleischstück im Larynxeingang festgesetzt. Bei einem Fall, den Schneider mitteilt, hatten Speisereste die Atmung in der von der Struma eingeengten Säbelscheidentrachea verlegt. Je 9 Fälle berichten Koopmann und Lesser. Dieser ist der Meinung, daß der Tod bei Fremdkörperaspiration schlagartig eintrete im Gegensatz zum Erhängungstod. Kalle hat durch Untersuchungen an 24 zum Erhängungstod Verurteilten festgestellt, daß der Tod niemals blitzartig mit dem Absturz in die Schlinge erfolgte, sondern daß das Herz 5 bis 20 Min. danach noch schlug. Weyrich erklärt sich den plötzlichen Bolustod durch eine reflexische Herzlähmung infolge Reizung der sensiblen Fasern des Nervus laryngeus superior. Bei den 5 Fällen unseres Materials waren folgende Hindernisse die Ursache des plötzlichen Todes: Nahrungsbrei bei einer 72jährigen Frau, eingekeilte große Wursthäutke im Schlund und Rachen bei einem 60 Jahre alten Maurer, Tabak bei einem 83 Jahre alten Manne, ein Unterkiefergebiß bei einem 56 Jahre alten Manne und völlige Ausfüllung der linken Hauptbronchien durch rohes Fleisch bei einem 70jährigen Manne. — Mit diesen Lungentodesfällen wäre die 3. große Gruppe abgeschlossen. Es folgt nun die 4. und zahlenmäßig noch kleinere Gruppe, die die plötzlichen Todesfälle durch Erkrankungen des Verdauungs- und Urogenitalapparates umfaßt.

7. Erkrankungen des Verdauungs- und Urogenitalapparates (10 Fälle)

Diese Hauptgruppe steht bei Weyrich zahlenmäßig an Stelle von allen zum plötzlichen Tode führenden Erkrankungen. Er verzeichnet 343 Todesfälle durch Erkrankungen des Verdauungs- und Urogenitalapparates, die einer Beteiligung von 17,2% am Gesamtmaterial entsprechen. Die Frauen (174 Fälle) haben eine geringe Mehrbeteiligung gegenüber den Männern (169 Fälle). Der Höhepunkt der allgemeinen Sterblichkeit lag im 6. Dezennium. Ferner konnte Weyrich feststellen, daß in den meisten Todesfälle in der kalten Jahreszeit erfolgten, daß in der warmen dagegen die Sterblichkeit stark abnahm. Die Erkrankungen der Bauchorgane teilt er ein in Erkrankungen des Urogenitalapparates, die 52,8% ausmachten, und in Erkrankungen des Verdauungsapparates (47,2%). Weiter unterteilt Weyrich die beiden Untergruppen in Erkrankungen des Harnapparates (159 Fälle — die bei weitem häufigste Todesursache

dieser Hauptgruppe), in Erkrankungen des Genitalapparates (22 Fälle), der Speiseröhre und des Magen-Darmtraktes (14 Fälle) und in Gallenblasen-, Pancreas- und Nebennierenerkrankungen (15 Fälle). Diese kurze Darstellung der Arbeit Weyrichs war nötig um klarzumachen, welche große Bedeutung der Erkrankungen der einzelnen Bauchorgane als Ursache des plötzlichen Todes innerhalb der von ihm mitgeteilten 2 668 Fälle zukommt.

Unser Material weist demgegenüber nur 10 Fälle auf, die an Erkrankungen des Verdauungs- und Urogenitalapparates überraschend gestorben waren. 3,2 % aller Todesfälle stellen sie dar. Es handelte sich um 6 Männer und 4 Frauen, die in einem Verhältnis von 60 % zu 40 % stehen. Prozentual auf die Gesamtheit der Frauen gesehen, überwiegt wieder das weibliche Geschlecht, denn es präsentiert 5,8 % aller Frauen, während das männliche nur 2,9 % aller Männer beträgt. Irgendwelche Schlüsse auf eine besondere Höhe der Sterblichkeit in einem Lebensjahre zehnt oder in einem Monat sind aus diesen wenigen Fällen nicht zu ziehen. Nur eins wäre trotzdem bemerkenswert, daß 8 von den 10 Fällen aus dem 60. bis zum 80. Lebensjahr stammen. Die Verteilung der Fälle auf die Monate ist eine allgemeine und besagt gar nichts.

In pathologisch-anatomischer Hinsicht lassen sich die Erkrankungen des Verdauungs- und Urogenitalapparates folgendermaßen einordnen:

- a) Gefäßrupturen des Verdauungstraktes
- b) Epitheliale Geschwülste des Verdauungstraktes
- c) Perforierende Appendicitis
- d) Magengeschwür
- e) Inkarzeration einer Leistenhernie
- f) Chronische Nierenerkrankung.

a) Gefäßrupturen des Verdauungstraktes:

Drei Verblutungstode durch Gefäßrupturen wurden gezählt. In einem Falle handelte es sich um einen 64-jährigen Invaliden, der bislang über keinerlei wesentliche Beschwerden geklagt hatte. Die Sektion stellte als Ursache des überraschenden Todes Verblutung in die Bauchhöhle fest aus einem faustgroßen Aneurysma der Arteria ileo-colica, das rupturiert war. — Die beiden anderen Fälle waren ein 57- und ein 57-jähriger Mann. Sie waren infolge Ruptur von varicösen Erweiterungen der Ösophagusvenen in den Magen-Darmkanal verblutet. Als Nebentbefund wurde jeweils Leannec'sche Leberzirrhose festgestellt.

epitheliale Geschwülste des Verdauungs- traktes:

Einmal konnte eine Geschwulst als Ursache des plötzlichen Todes angesehen werden. In beiden Fällen war es ein Carcinom. In einem Fall 42 Todesfälle durch Geschwülste mit: ausnahmslos handelte es sich um Carcinome. Die gleiche Beobachtung von Markovitz, Koopmann u. a. gemacht. Einmal war es ein 64 Jahre alter Mann, der ein ulzeriertes Cardia-Carcinom hatte und als Nebebefund Herzdilatation und Lungenödem. Im anderen Falle war es eine 74jährige Frau, die tot aufgefunden wurde. Die Sektion ergab einen massiven Mastdarmkrebs, der die Blase durchgebrochen war. Die Perforation des Carcinoms und die folgende Peritonitis führten dann in beiden Fällen zum erwarteten Tode.

Perforierende Appendicitis:

Bei einer 27 Jahre und einer 69 Jahre alten Frau führte perforierende Appendicitis durch Perforation mit nachfolgender Peritonitis zum plötzlichen Tod. Der erstgenannte Fall hatte als wesentlichen Nebebefund Eiterphlebe in beiden Tonsillen.

Magengeschwür:

Diese Erkrankung war in einem Falle — bei einem 51jährigen Mann — die Todesursache. Zugrunde lag die Perforation eines Magengeschwürs in die Bauchhöhle, die den plötzlichen Tod veranlaßte.

Carceration einer Leistenhernie:

Ein 73 Jahre alter Invalide zeigte als Ursache des unerwarteten Todes einen rechtsseitigen Leistenbruch, der zur Einklemmung des oberen und unteren Dünndarmschlingen geführt hatte, und zu einer diffusen Durchwanderungsperitonitis, die für den Mann den Tod bedeutete. Coronarsklerose, Herzdilatation und Lungenödem waren die Nebebefunde.

Chronische Nierenerkrankung:

Der letzter Fall dieser vierten Hauptgruppe wäre eine 55jährige Frau zu nennen, bei der als Todesursache pyelonephrotische Nierenerkrankung anzusehen waren. Es wurde schon verschiedentlich die Bedeutung der chronischen Nierenerkrankung für den plötzlichen Tod, insbesondere den Herztod hingewiesen. Auch in diesem Falle dürfte der plötzliche Tod durch Herzlähmung eingetreten sein. Es fand sich eine erhebliche Dilatation des ganzen Herzes.

B VI. Erkrankungen anderer Organe (7 Fälle)

In diese letzte große Gruppe wurden alle die Fälle aufgenommen, die infolge der Eigenart ihrer Erkrankungen in die vier genannten Hauptgruppen nicht eingeordnet werden konnten. Es verblieben 7 plötzliche Todesfälle (2 Männer und 5 Frauen). Pathologisch-anatomisch ergaben diese Fälle 4 Untergruppen:

- a) Epilepsie
- b) Allgemeine Kachexie
- c) Perniciöse Anämie
- d) Wegen Fäulnis unaufgeklärter Fall.

a) Epilepsie:

Verschiedentlich schon wurden plötzliche Todesfälle im epileptischen Anfall beschrieben (Weyrich, Lesser, Thorner, Kolisko, Schneider u.a.). In unserem Material waren 3 derartige Fälle: Eine 26- und eine 51jährige Frau und ein 35 Jahre alter Musiker. Nur im ersten Falle war die eigentliche Todesursache ein akutes Ödem des Gehirns, das bei Weyrich bei allen Fällen vorlag. Kolisko hält die Intoxikationszustände im Anfall für recht gefährlich und für mitverantwortlich für den Eintritt des plötzlichen Todes neben dem durch die Hyperämie bedingten Ödem, das dann zur Hirnlähmung führt. Dies trifft für den genannten Fall zu. Im zweiten Fall jedoch hatte ein akutes Lungenödem zum Erstickungstod geführt. Thymushyperplasie ergab sich als Nebebefund. Thorner und Lesser glauben, daß dem Lungenödem nur sekundäre Bedeutung zukomme. Die tödliche Wirkung übten vielmehr — bedingt durch den epileptischen Anfall — Muskelkrämpfe der Respirationorgane aus. Im dritten und letzten Fall war der epileptische Anfall nicht restlos als Ursache des überraschenden Todes auszumachen. Es lag ein schlechter Ernährungszustand vor; außerdem ein Lungenödem und eine akute Lungenblutung.

b) Allgemeine Kachexie:

Zwei Frauen — eine im 39. und eine im 65. Lebensjahr — starben plötzlich unter schwerer allgemeiner Kachexie. Die Nebefunde waren gering: Pleuraverwachsungen, Herzdilatation und Atrophie des Herzmuskels.

c) Perniciöse Anämie:

Thorner und Weyrich haben einige plötzliche Todesfälle beschrieben, die durch perniciöse Anämie bedingt waren. Doch sind diese Fälle wohl selten. Unser Material wies einen Fall

inen 57 Jahre alten Fabrikaufseher. Als Nebebefunde fand sich ein leichtes Lungenödem und eine feine „Tigerung“ des Muskels.

egen Fäulnis unaufgeklärter Fall:

Bei einer 75jährigen Frau konnte die Todesursache nicht mehr als hochgradiger Fäulnis ausgemacht werden. Es stand aber fest, daß der Tod plötzlich und aus innerer Ursache erfolgt war.

C. Die forensische Bedeutung des plötzlichen Todes aus innerer Ursache.

Es wird das überraschende Ableben irgendeiner Person, bisher ganz gesund zu sein schien, die Anverwandten und Bekannten nicht nur wie bei jedem Todesfall beunruhigen, sondern ihnen etwas unheimlich und rätselhaft vorkommen. Nicht selten werden dann, wenn die allgemeinen äußeren Verhältnisse normalen waren, Meinungen laut, daß der plötzliche Tod natürlicher sei, sondern daß fremde, gewaltsame Einflüsse herbeigeführt hätten. Dem Hüter des staatlichen und bürgerlichen Rechtes werden bei jedem plötzlichen Todesfall Zweifel an der Richtigkeit der ihm mitgeteilten Ursache dieses Todes, außer wenn nicht von ärztlicher Seite durchaus klare Angaben gemacht wurden, aus welchem Grunde der Tod eintrat. Die angeführten Fälle beweisen, daß vollkommen gesunde und reife Menschen jeglichen Alters der plötzliche Tod ereilen.

Doch hat die Erfahrung vielfach bewiesen, daß sich hinter derartigen Todesfall aus angeblich innerer Ursache ein Verbrechen oder ein Selbstmord verbarg, daß der plötzliche Tod aus keinem natürlichen, sondern ein gewaltsamer war — selbst wenn die nächste Umgebung des Toten von der innerlichen Bestimmtheit des unerwarteten Todes überzeugt war. Doch auch umgekehrt kann der Sachverhalt liegen. Eine gewaltsame Tötung wird angenommen, und die Sektion ergab einen Tod aus innerer Ursache trotz größerer äußerer Verletzungen.

Aus diesen kurzen Bemerkungen wird die große forensische Bedeutung des unerwarteten Todes klar. So gilt es bei jedem plötzlichen Todesfall die wirkliche Ursache des Ablebens festzustellen. Totenscheine mit den Angaben „Herzschlag“, „Herz-

lähmung“, „Lungenschlag“ oder „Hirnschlag“ ohne nähere Erläuterungen werden deshalb vom Standesbeamten zurückgewiesen — besonders wenn vorausgehende ärztliche Beobachtungen fehlen —, und die Leiche wird zwecks näherer Klärung der Todesursache zur amtlichen Sektion eingeliefert. Erhöhte Bedeutung kommt der Sektion in den Fällen zu, bei denen die Leiche verbrannt werden soll, wodurch auch spätere Untersuchung unmöglich gemacht würden. Es besteht die Verpflichtung, die Leichen, ehe sie zur Feuerbestattung frei gegeben werden müssen, um einen möglicherweise gewaltsam erfolgten Tod festzustellen. Von den 314 plötzlichen Todesfällen wurden 17 auf Weisung des Standesbeamten oder Amtsarztes seziert, 120 mal hatte sich bereits die Polizeibehörde und 23 mal die Staatsanwaltschaft mit dem „plötzlichen Todesfall auf der Straße“ oder „in der Wohnung“ befaßt und die gerichtsärztliche Sektion veranlaßt. Der behandelnde Arzt hatte bei 15 Fällen von sich aus die amtliche Öffnung der Leiche beantragt, da er nicht in der Lage war, eine genaue Todesursache anzugeben. Neun plötzliche Todesfälle wurden auf Wunsch der Angehörigen und 8 Fälle auf Veranlassung der jeweiligen Versicherung seziert. Die Angehörigen wünschten die Sektion weniger deshalb um zu erfahren, worin ihr Familienmitglied so überraschend gestorben war, sondern um materielle Vorteile zu erlangen, indem sie z. B. einen früh stattgefundenen Unfall mit folgender Oberarmamputation in Verbindung mit dem plötzlichen Tod brachten, oder um in den Genuss der Versicherungssumme zu kommen, nachdem der Selbstmord gerichtsärztlich ausgeschlossen wurde. Diese Gründe und auch der Verdacht auf Mord durch fremde Hand (z. B. Ehefrau) veranlaßten die Versicherungsgesellschaften, die Sektion zu beantragen.

Bei der größten Zahl der Fälle hatte allein das Verlangen des Amtsarztes, des Standesbeamten oder der Polizei, jede mögliche widernatürliche Handlung auszuschließen und zu klären, worin der plötzliche Tod eingetreten war, die Sektion herbeigeführt, ohne daß ein bestimmtes Verbrechen oder die Vermutung auf ein solches angenommen war. In einzelnen Fällen jedoch hatte der offen ausgesprochene Verdacht auf eine Vergiftung oder Mißhandlung oder ähnliches den Staatsanwalt oder die Polizei veranlaßt, auf eine amtliche Leichenöffnung zu dringen. Der häufigste Verdacht war der auf Vergiftung. 20 Leichen wurden deshalb geöffnet, wobei sekundär zu klären gewesen wäre, ob die Vergiftung durch fremde Hand (Liebhaber, Ehefrau z. B.), in selbstmörderischer Absicht (Gas-, Schlafmittelvergiftung) oder durch unglückliche Umstände (Ofengase) bedingt war. 13 mal war zu klären, ob es sich um einen Mord oder um ein selbst verschul-

oder durch einen Unfall hervorgerufenes Trauma handelte ob die Verletzungen agonaler Natur waren. Zweifellos stößt Lösung oft auf erhebliche Schwierigkeiten, wenn wie bei en Fällen nach einem Sturz von der Leiter, Treppe, vom oder in die Grube die Halswirbelsäule gebrochen ist oder elbruch, Rippen- und andere Knochenbrüche und Weich- etzungen vorlagen. Bei 5 Fällen war es strittig, ob die ehabte Mißhandlung den Tod zur Folge gehabt haben könnte. die Obduktion konnte auch hier entscheiden. Der Arzt e zweimal beschuldigt, den plötzlichen Tod seines Patienten egeführt zu haben: einmal durch falsche Salvarsanbehand- und ein anderes mal sollte eine Abtreibung der Frau das n gekostet haben. Schließlich war in einem weiteren Falle eilpraktiker wegen fahrlässiger Tötung angeklagt worden, em sich der Patient am Tage vor seinem plötzlichen Tod in ndlung begeben hatte. Verschiedenster Art waren also die ichkeiten, die Verdachtsmomente bei plötzlichem Tod auf- en ließen und die gerichtliche Sektion zur Klärung benötig-

on ebenfalls nicht geringer forensischer, aber auch medizi- er Bedeutung ist der Ort, an dem der plötzliche Tod den chen ereilt, da sich daraus Schlüsse auf die letzte Tätigkeit die Umgebung des Betreffenden ziehen lassen. 152 Proto- wiesen entsprechende Angaben auf. 76 plötzliche Todesfälle) erfolgten in der Wohnung, 41 auf der Straße, 17 auf der tsstätte, 11 im Zuge oder auf dem Bahnhof, 5 im Auto von auf dem Transport ins Krankenhaus) und 2 im Gasthaus.älfte der Fälle erfolgte also in der Wohnung, während der iche Tod auf der Straße sich am zweithäufigsten ereignete. r i c h und K o o p m a n n haben gleiche Feststellungen tref- önnen.

D. Schlußbetrachtung.

plötzliche Todesfälle kamen zur Beobachtung. Sie betrafen ännliche und 105 weibliche Personen. Fast $\frac{2}{3}$ der plötzlich rbenen (66 %) waren also Männer. Das Sterblichkeitsmaxi- aller Fälle (27,2 %) lag im 8. Dezennium; ebenfalls das der n allein (32 %). Die Männer zeigten ihren Sterblichkeits- unkt (27,7 %) im 6. Jahrzehnt. 12,1 % aller Fälle starben im April, der die höchste Sterblichkeit aufwies. Das Minimum

lag im Juli mit 5,7 %. Männer wie Frauen wiesen auch ihren Höhepunkt und Tiefstand der Sterblichkeit in den genannten Monaten auf. Im Winterhalbjahr (Oktober—März) starben 52,5 % aller plötzlich Verstorbenen, was einen kaum nennenswerten Einfluß der kälteren Monate bezeugt.

Die bei weitem häufigste Todesursache lag in „Erkrankungen des Herzens, seiner Gefäße und der Aorta“, da sie 235 Fälle = 74,9 % umfaßte. Es folgten die „Erkrankungen des Gehirns und seiner Hüllen“ mit 10,8 %, die „Erkrankungen des Respirationsapparates“ mit 8,9 % und die „Erkrankungen des Verdauungs- und Urogenitalapparates“ mit 3,2 %. Bei allen Krankheitsgruppen überwog der männliche Anteil. Im folgenden sei eine Aufstellung gegeben über die am zahlreichsten aufgetretenen Einzelerkrankungen:

Coronarsklerose	56,1 %	aller Fälle
Mesaortitis luica	10,5 %	„ „
Spontane Hirnblutung	7,0 %	„ „
Pneumonie und Pleuritis	3,2 %	„ „
Herzklappenfehler	2,2 %	„ „
Braune Atrophie des Herzmuskels	1,9 %	„ „
Hypertrophie und Dilatation des Herzens	1,6 %	„ „
Intermeningeale Blutung	1,6 %	„ „

Die überragende Bedeutung der Coronarsklerose kommt hier zum Ausdruck. Wohl in allen Statistiken, die aufgestellt wurden, ist sie die häufigste plötzliche Todesursache. Dann folgt (auch bei Weyrich u. a.) die Mesaortitis luica. Die folgenden Erkrankungen haben gemäß ihrer Häufigkeit bei anderen Autoren eine etwas verschiedene Reihenfolge. Doch stimmen diese Prozentsätze mit anderen Ergebnissen annähernd überein. So bestreiten die genannten 8 Erkrankungen 84,1 % aller plötzlichen Todesfälle und damit sind sie die Erkrankungen, die am allerhäufigsten und im wesentlichsten den unerwarteten, überraschenden Tod an natürlicher, innerer Ursache bewirken.

Bereits im einleitenden Teil wurde auf den Einfluß und die Bedeutung der „Gelegenheitsursachen“ hingewiesen, die diese auf den organisch erkrankten Organismus ausüben. Ihre Wirkung beruht darin, daß sie den ohnehin augenblicklich in seiner Widerstandskraft geschwächten Körper zusätzlich entscheidend belasten und den plötzlichen Tod herbeiführen. In dem hier angeführten Material war die körperliche Anstrengung die häufigste Gelegenheitsursache. Ebenfalls häufig fand sich ein stark gefüllter Magen. In einigen Fällen waren wohl körperliche Anstrengung und starke Magenfüllung für den Eintritt des Todes mit verantwortlich zu machen. 2 mal trat der Tod während des Coitus ein, und einmal nur fand sich ein Status menstruationis.

Schrifttums-Verzeichnis.

- Hoff: „Die militärärztliche Sachverständigentätigkeit“ Bd. II, 1917, Fischer Jena.
 Patholog. Anatomie“, Spez. Teil.
 Zieglers Beiträge z. patholog. Anatomie“, 1916, 63.
 Zanke, H.: „Tod und Herz“, Ergebnisse der ges. Medizin, Bd. 14.
 Zanger: „Kritisch-Statistisches über plötzliche Todesfälle aus natürlicher Ursache“, Inaug. Diss., München (nach Schwarzmüller.)
 Ziemer, W.: Virchows Archiv 1923, Bd. 245.
 Zing: „Magenfüllung und plötzlicher Tod“, Viert. f. g. M. 1919.
 Zisch, A.: Ref. D. Zschr. f. d. ges. ger. Med. Bd. 16 Seite 113.
 Zisch: „Über den plötzlichen Tod durch Herzlähmung“, Berlin 1904.
 Zisch, G.: „Statistica delle morti improvisae etc.“ Milano 1843 (nach Key-Aberg.)
 Zisch, A.: „Lehrbuch der Gerichtlichen Medizin“ 1927.
 Zisch: „Lehrbuch der Obduktion“ in Dittrichs Handbuch der ärztlichen Sachverständigentätigkeit, Bd. II, 1913.
 Zisch: „Wochenschrift“ 1924 Nr. 17.
 Zisch: „Handbuch I“.
 Zisch: „Der Sekundenherztod“, Berlin 1917.
 Zisch-Popp: „Der plötzliche Tod aus inneren Ursachen“, Regensburg 1848.
 Zisch, G.: „Grundriß der Pathologischen Anatomie“, München.
 Zisch, E.: „Über den plötzlichen Tod aus natürlichen Ursachen“, Vortrag im Verein z. Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse, 1884.
 Zisch: „Über Aneurysmen der Basilararterien und deren Ruptur als Ursache des plötzlichen Todes“, Verhandlg. der 66. Versammlung. deutsch. Naturforscher und Ärzte in Wien.
 Zisch, R.: „Über plötzliche Todesfälle und ihre Pathogenese“. Dtsche. d. Wochenschrift 1928 II.
 Zisch: „Über die Bedeutung der Endarteritis chronica deformans als Ursache plötzlichen Todes“, Vjschr. ger. Medizin Bd. 48 36 ff., 404 ff.
 Zisch: „Über die Sklerose der Kranzarterien des Herzens als Ursache plötzlichen Todes“, Vjschr. ger. Medizin Bd. 50.
 Zisch: „Zur Kreislaufforschung“, Ergebnisse der Pathologie, Lubarsch Ostertag, 20.
 Zisch: „Mors subita bei Herzkranken“, M. med. Wochenschr. 1908, 14.
 Zisch: „Über plötzliche Todesfälle aus natürlicher Ursache bei fortgeschrittener bzw. am Ende der Schwangerschaft“, Inaug.-Diss. München 1935.
 Zisch: „Dtsch. Z. gerichtl. Med. 22, 192, 1935.
 Zisch, A.: „Plötzlicher Tod aus natürlicher Ursache“, Handbuch der gerichtl. Sachverständigentätigkeit von Dittrich Bd. 2, Seite 793 ff.

- Koopmann: „Über den plötzlichen Tod aus natürlicher Ursache“, D. Z. gerichtl. Med, 1926, Bd. VIII, Seite 91 ff.
- Legros, A.: „Sur la pathogenie des morts subites“, Lyon 1893 (n. Thorner.)
- Lesser: „Stat. über Todesursachen in 1000 gerichtl. obduz. Fällen“, Zschr. f. Med. Beamte 1893.
- „Die wichtigsten Sektionsergebnisse in 171 Fällen plötzl. Todes“, Vjschr. f. ger. Med. Bd. 48, 1888.
- Lochte: „Beobachtungen über den plötzl. Tod aus inneren Ursachen“, Vjschr. f. ger. Med. Bd. 59.
- Markovin, J., „Zur Frage über den plötzlichen Tod“, Ref. D. Z. f. ges. ger. Med. Bd. XIV, Heft 5, S. 241.
- Merkel, H.: Selbstbericht in Münch. med. Wochenschrift 1931—652.
- „Patholog. anatom. Demonstrationen“, Münch. med. Wochenschr. 1910.
- Mönckeberg, F.: „Das Gefäßsystem und seine Erkrankungen“, (n. Schwarzmüller).
- Lubarsch-Henke 2. Bd. Berlin 1924, Seite 525 ff.
- Pöder, P.: „Über den plötzlichen Tod aus natürlicher Ursache“, Eesti Arst. 7, 1928, Ref. D. Z. f. d. ges. ger. Med., Bd. 13.
- Reuter, F.: „Über den plötzlichen Herztod und dessen Nachweis an der Leiche“, Wr. klin. Wochschr. 1926, Nr. 38.
- „Welche Bedeutung hat die Sektion des Schädels in Fällen plötzlichen Todes?“, D. Z. f. d. ges. ger. Med., Bd. 9.
- Richter, M.: „Gerichtsärztliche Diagnostik und Technik“, Leipzig 1905.
- „Über plötzliche Todesfälle“, Zeitschr. f. Med.-Beamte 1911.
- Schneider, W. H.: „Ursachen des sog. plötzlichen Todes“, D. Z. f. d. ges. ger. Med. Bd. 2, Seite 293, 1923.
- Schönberg: „Plötzliche Todesfälle“, Zeitschr. f. ärztlich. Fortbildung, Jg. 20, Nr. 24, 1923.
- Schwarzmüller: „Bemerkenswerte Fälle vom plötzlichen Herztod bei körperlicher Anstrengung“, Inaug.-Diss. München 1937.
- Szekely, K.: „Aneurysma der Hirnarterie“, Beitr. z. ger. Med., Bd. 8, S. 162 ff.
- Thorner: „Über den sog. spontanen plötzlichen Tod“, Schweizer med. Woch.-Schr. Heft 36 u. 37, 1921.
- Weinert: „Plötzliche Todesfälle bei Soldaten“, M. med. Wochschr. 1917, 37.
- Weyrich, G.: „Erfahrungen über den plötzlichen Tod aus natürlichen Ursachen bei Erwachsenen“, D. Z. f. d. ges. ger. Med., Bd. 18, Seite 211.
- „Erfahrungen über den plötzlichen Tod aus natürlichen Ursachen bei Kindern und Jugendlichen“, D. Z. f. d. ges. ger. Med., Bd. 22, S. 116.
- „Statistische Untersuchungen über den plötzlichen Tod aus natürlicher Ursache bei Erwachsenen“, Beitr. z. ger. Med. v. Haberdas, Bd. 12, Seite 146.
- Wietrich: „Plötzlicher Tod infolge seelischer Erregung“, Ref. Klauffer, D. Z. f. d. ges. ger. Med., Bd. 19, 1932.
- Woll: „Die Røller der erworbenen cardio-vasculären Syphilis bei den Fällen von plötzlichem Tod aus natürlicher Ursache“, Inaug.-Diss. München 1932.

Lebenslauf.

Als Sohn des Pfarrers Ewald Blackstein wurde ich am 24. Dezember 1914 in Magdeburg geboren. Ostern 1921 kam ich auf die Privatschule und 3 Jahre später auf die Mittelschule in Klötze/Altmark. Im Frühjahr 1923 starb mein Vater, und ich wurde von meinem Onkel, dem prakt. Arzt Dr. med. Siegfried Blackstein, Klötze, adoptiert. Ostern 1929 ging ich auf das Reform-Real-Gymnasium zu Gardelegen über, an dem ich am 8. März 1933 die Reifeprüfung ablegte.

Ich wendete mich dem medizinischen Studium zu und hörte das 1. Semester in Graz. Es folgten 3 Semester in Halle. Vom 1. April bis 30. September 1935 war ich im Reichsarbeitsdienst. Am 23. Oktober 1935 bestand ich die naturwissenschaftliche Vorprüfung in Halle. Darauf setzte ich mein Studium in Rostock fort und legte den 2. Abschnitt der ärztlichen Vorprüfung am 4. Juli 1936 ab. Das 1. klinische Semester verbrachte ich in München, um dann die 4 restlichen Semester bis zur ärztlichen Abschlußprüfung wieder in Halle zu belegen.

Gottfried Blackstein.

